

| Especie | Máximo | Mínimo | Evolución anual (%) | Tendencia |
|----------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 9,1 | -11,5 | -1,2 | Incierto |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | 16,2 | -1,4 | 7,4 | Incierto |
| <i>Aegithalos caudatus</i> | 1,9 | -5,4 | -1,8 | Incierto |
| <i>Alauda arvensis</i> | 0,8 | -2,8 | -1,0 | Estable |
| <i>Alectoris rufa</i> | 6,8 | 0,8 | 3,8 | Incremento moderado (p<0.05) * |
| <i>Anthus campestris</i> | 8,4 | -2,1 | 3,2 | Incierto |
| <i>Anthus trivialis</i> | 4,3 | -2,0 | 1,1 | Estable |
| <i>Apus apus</i> | 0,8 | -2,8 | -1,0 | Estable |
| <i>Athene noctua</i> | 28,2 | -6,7 | 10,7 | Incierto |
| <i>Buteo buteo</i> | 1,4 | -3,0 | -0,8 | Estable |
| <i>Calandrella brachydactyla</i> | -3,6 | -17,0 | -10,3 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Carduelis cannabina</i> | -1,5 | -5,5 | -3,5 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Carduelis carduelis</i> | 3,2 | -0,5 | 1,4 | Estable |
| <i>Carduelis chloris</i> | 5,3 | 1,3 | 3,3 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Certhia brachydactyla</i> | 6,4 | -0,9 | 2,8 | Incierto |
| <i>Cettia cetti</i> | 2,3 | -1,9 | 0,2 | Estable |
| <i>Cisticola juncidis</i> | -5,3 | -14,7 | -10,0 | Declive fuerte (p<0.05) * |
| <i>Columba livia</i> | 0,8 | -5,4 | -2,3 | Incierto |
| <i>Columba oenas</i> | 0,7 | -17,2 | -8,2 | Incierto |
| <i>Columba palumbus</i> | 2,0 | -2,9 | -0,4 | Estable |
| <i>Corvus corax</i> | 2,2 | -3,9 | -0,8 | Estable |
| <i>Corvus corone</i> | 2,2 | -3,9 | -0,8 | Estable |
| <i>Corvus monedula</i> | -6,5 | -17,4 | -11,9 | Declive fuerte (p<0.05) * |
| <i>Coturnix coturnix</i> | -3,2 | -7,9 | -5,6 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Cuculus canorus</i> | 5,4 | 3,0 | 4,2 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Delichon urbicum</i> | 5,0 | -0,1 | 2,4 | Estable |
| <i>Dendrocopos major</i> | 9,8 | 3,5 | 6,6 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Emberiza calandra</i> | -0,3 | -3,6 | -2,0 | Declive moderado (p<0.05) * |
| <i>Emberiza cia</i> | 4,6 | -2,9 | 0,8 | Estable |
| <i>Emberiza cirius</i> | 0,8 | -4,7 | -2,0 | Estable |
| <i>Emberiza citrinella</i> | -3,7 | -9,2 | -6,4 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Emberiza hortulana</i> | 2,9 | -10,1 | -3,6 | Incierto |
| <i>Erithacus rubecula</i> | 4,0 | 0,5 | 2,2 | Incremento moderado (p<0.05) * |
| <i>Falco tinnunculus</i> | 0,1 | -5,8 | -2,8 | Incierto |
| <i>Fringilla coelebs</i> | 5,2 | 1,9 | 3,6 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Galerida cristata</i> | 0,8 | -4,9 | -2,1 | Estable |
| <i>Garrulus glandarius</i> | 6,2 | 0,7 | 3,5 | Incremento moderado (p<0.05) * |
| <i>Hippolais polyglotta</i> | 6,7 | 1,2 | 3,9 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Hirundo rustica</i> | 2,7 | -1,1 | 0,8 | Estable |
| <i>Jynx torquilla</i> | 2,4 | -6,8 | -2,2 | Incierto |
| <i>Lanius collurio</i> | 5,6 | -0,3 | 2,7 | Incierto |
| <i>Lanius senator</i> | 11,5 | -6,6 | 2,5 | Incierto |
| <i>Lullula arborea</i> | 2,2 | -4,4 | -1,1 | Estable |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> | 2,4 | -1,5 | 0,4 | Estable |
| <i>Motacilla alba</i> | -1,3 | -5,3 | -3,3 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Motacilla cinerea</i> | 2,3 | -6,9 | -2,3 | Incierto |
| <i>Motacilla flava</i> | 0,9 | -6,8 | -3,0 | Incierto |
| <i>Oenanthe oenanthe</i> | 5,9 | -0,8 | 2,6 | Incierto |
| <i>Oriolus oriolus</i> | 4,6 | -1,2 | 1,7 | Estable |
| <i>Parus ater</i> | 5,1 | -1,3 | 1,9 | Incierto |
| <i>Parus caereleus</i> | 3,2 | -0,8 | 1,2 | Estable |
| <i>Parus cristatus</i> | 8,4 | -3,7 | 2,4 | Incierto |
| <i>Parus major</i> | 1,8 | -1,5 | 0,1 | Estable |
| <i>Passer domesticus</i> | 0,5 | -2,4 | -0,9 | Estable |
| <i>Passer montanus</i> | 2,1 | -3,5 | -0,7 | Estable |

| Especie | Máximo | Mínimo | Evolución anual (%) | Tendencia |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------------------------|
| <i>Phoenicurus ochruros</i> | 4,5 | -0,7 | 1,9 | Estable |
| <i>Phylloscopus bonelli</i> | 8,5 | 2,2 | 5,4 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Pica pica</i> | 2,2 | -1,7 | 0,2 | Estable |
| <i>Picus viridis</i> | 4,0 | 0,0 | 2,0 | Estable |
| <i>Prunella modularis</i> | 4,5 | -0,8 | 1,9 | Estable |
| <i>Ptyonoprogne rupestris</i> | 10,0 | -1,0 | 4,5 | Incierto |
| <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | 9,1 | -6,4 | 1,4 | Incierto |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 1,8 | -7,7 | -2,9 | Incierto |
| <i>Regulus ignicapillus</i> | 4,0 | -2,6 | 0,7 | Estable |
| <i>Saxicola rubetra</i> | -2,6 | -22,7 | -12,7 | Declive moderado (p<0.05) * |
| <i>Saxicola torquata</i> | -2,7 | -6,8 | -4,8 | Declive moderado (p<0.01) ** |
| <i>Serinus serinus</i> | 1,9 | -1,4 | 0,3 | Estable |
| <i>Sitta europaea</i> | 7,3 | -2,5 | 2,4 | Incierto |
| <i>Streptopelia decaocto</i> | 15,5 | 7,2 | 11,3 | Incremento fuerte (p<0.01) ** |
| <i>Streptopelia turtur</i> | 1,1 | -5,8 | -2,3 | Incierto |
| <i>Sturnus unicolor</i> | 3,0 | -0,7 | 1,2 | Estable |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | 6,3 | 2,6 | 4,5 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Sylvia borin</i> | 4,1 | -3,4 | 0,3 | Estable |
| <i>Sylvia communis</i> | 2,2 | -4,1 | -1,0 | Estable |
| <i>Sylvia melanocephala</i> | 12,1 | -3,3 | 4,4 | Incierto |
| <i>Sylvia undata</i> | -0,1 | -11,0 | -5,6 | Declive moderado (p<0.05) * |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | 2,6 | -0,9 | 0,8 | Estable |
| <i>Turdus merula</i> | 1,1 | -1,7 | -0,3 | Estable |
| <i>Turdus philomelos</i> | 5,3 | 1,6 | 3,4 | Incremento moderado (p<0.01) ** |
| <i>Turdus viscivorus</i> | 8,6 | -1,4 | 3,6 | Incierto |
| <i>Upupa epops</i> | 9,8 | 0,5 | 5,1 | Incremento moderado (p<0.05) * |