


NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS 2007

Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

Recopilación y edición: Joan Carles Fernández-Ordóñez,
Jordi Clavell, David M. Santos, Antonio Polo,
Marcelino Martín.

Mayo 2008



Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

www.seo.org/?grupodeavesexoticas

exoticas@seo.org

Noticario de aves exóticas

Este documento es una recopilación de citas de aves exóticas observadas en libertad en nuestro país durante el año de 2007. También se incluyen algunas citas pertenecientes a años anteriores (conocidas recientemente) y que son señaladas con una entrada en color azul.

Además de citas de ejemplares de aves exóticas, este documento incluye también las citas de cualquier tipo de ejemplar que haya sido introducido por el hombre. Estos pueden pertenecer a:

- **Especies nativas.** En ocasiones son introducidos ejemplares de especies autóctonas, es decir, de especies que se encuentran ya de forma natural en nuestro país. La inclusión en el presente documento de estos ejemplares se justifica por desconocerse, en la mayoría de los casos, su auténtica identidad taxonómica. En muchos casos los ejemplares introducidos pertenecen en realidad a una subespecie o variedad diferente de la nativa. Y en ocasiones pueden presentar también algún grado de hibridación.
- **Variedades domésticas.** En ocasiones son introducidos ejemplares de variedades que son resultado de la modificación artificial de especies silvestres, ya sean nativas o exóticas. En determinados casos se considera que la selección artificial ha modificado suficientemente su genoma como para tratar a los ejemplares de estas variedades separadamente (tal como si fueran especies exóticas).
- **Híbridos.** En ocasiones son introducidos ejemplares que son resultado de la hibridación entre especies nativas, exóticas y domésticas. Cualquier grado de hibridación entre estos grupos justifica que los ejemplares sean tratados separadamente.

El presente documento, por incluir las citas correspondientes al año 2007, no presenta la totalidad de las especies que han sido introducidas en nuestro país. Puede accederse a la lista completa de especies (Categorías C y E) en nuestra página electrónica:

http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?dPrograma=17&idArticulo=271

Listado de especies

Las especies se presentan agrupadas en familias y ordenadas siguiendo el orden taxonómico más habitual. Para cada especie se ha elaborado, tras el encabezamiento, un pequeño texto introductorio.

Encabezamiento

En el encabezamiento de cada especie consta en primer lugar el **nombre científico**, seguido del **nombre vulgar** más habitual y, por último, un símbolo que señala el grado de establecimiento de la especie en nuestro país:

- Ejemplares observados ocasionalmente (Categoría E3).
- Ejemplares o poblaciones con reproducción registrada (Categoría E2).
- Poblaciones con reproducción regular, próximas a establecerse (Categoría E1).
- Poblaciones establecidas (Categoría C).

Además, cuando las citas suponen la primera observación de la especie en nuestro país, se añade la indicación: **nueva**.

Texto introductorio

Para cada especie suele señalarse: la situación en que se encuentra la especie en nuestro país; la categoría que le es asignada como consecuencia de ese estado; la zona geográfica de que es originaria la especie; las causas principales de su introducción en nuestro país; etc.

La categoría es aquí señalada por separado para las dos principales zonas zoogeográficas de nuestro país: la formada por la Península y las islas Baleares y la formada por las Islas Canarias. Se representa de la siguiente forma:

Categoría: (Pen. y Bal.) / (Canarias).

Después del texto introductorio se añade información recogida sobre la especie en los anteriores Noticiarios de Aves Exóticas (2003-2006). Se incluyen los siguientes datos:

- **Citas:** Indica el número total de registros (entradas) recogidos en los anteriores Noticiarios. Se señala como “+” cuando dicho valor es superior a diez.
- **Años:** Se indican todos los años en que existen citas.
- **Máx ind:** Se indica el número máximo de individuos registrados en una sola observación.

Citas de especies

Para cada especie, las citas han sido agrupadas por Comunidades autónomas. Dentro de cada una de ellas, las citas se encuentran ordenadas cronológicamente.

A menudo han sido agrupadas en una única entrada todas las citas que corresponden aparentemente al mismo ejemplar o al mismo grupo de ejemplares.



Cisne vulgar (*Cygnus olor*). Foto: Luis Fidel Sarmiento.

Agradecimientos

El presente documento es una recopilación de las citas de especies de aves exóticas publicadas, divulgadas o transmitidas directamente al Grupo de Aves Exóticas durante el año de 2007. Queremos por tanto agradecer a todas las personas que, de una forma o de otra, han intervenido en la elaboración de este Noticiero por su interés en documentar la presencia de aves exóticas en nuestro país.

El presente Noticiero señala la introducción de más de un centenar de especies en España durante el año de 2007, siendo la gran mayoría especies exóticas. Esta cifra alarmante revela el grave impacto a que regularmente son sometidos nuestra fauna y nuestros ecosistemas autóctonos. Igualmente señala la imperiosa necesidad de actuar eficazmente para acabar con esta situación y evitar la aparición de nuevas especies exóticas invasoras en nuestro país.

Cita recomendada para el documento:

GRUPO DE AVES EXÓTICAS (SEO/BirdLife) (Coord.: Fernández-Ordóñez, J.C., Clavell, J., Santos, D.M., Polo, A., Martín, M.). 2008. Noticiero de aves exóticas 2007. www.seo.org/?grupodeavesexoticas

NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS

STRUTHIONIDAE

Struthio camelus

avestruz ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 03; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 08.07.2004, carretera de Oix, Colldebrucs, Montagut, en la Garrotxa (**Girona**) (M. Sentís, comunicado por Carlos Álvarez).

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

suiriri bicolor ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / – . Originaria de América, África, India.

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 1.



Dendrocygna bicolor.
Nigrán,
Pontevedra, 2007.
Foto: César Vidal.

CATALUÑA

- 2 ej., 07 al 29.04.1991, P. N. dels Aiguamolls de l'Empordà, Castelló d'Empúries (**Girona**) (Carlos Alvarez Cros, Aleix Comas Herrera, Ponç Feliu Latorre, Albert Alemany Capella, Toni Llobet François y otros). Fotos. Probablemente escapados de la vecina localidad de Ventalló.
- 3 ej., 12.10.2006, R. N. Remolar-Filipines, Viladecans (**Barcelona**) (Pedro Bescós). Foto.

GALICIA

- 1 ej., de 08.2006 hasta 02.2007, regato Muiños, Nigrán (**Pontevedra**) (César Vidal). Foto.

Cygnus olor

cisne vulgar

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / E3**. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 12.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 31.01.2007, Mijas Costa (**Málaga**) (Juan Carlos Grandero y Teo Todorov), cerca del faro de Calaburras. Volando en dirección a Marbella.

BALEARS

- 1 ej., 30.11.2007, s'Albufereta, Pollença (**Mallorca**) (Maties Rebassa). Foto.
- 1 ej., 13.12.2007, Maristany, Alcúdia (**Mallorca**) (Pere Vicens; Jordi Muntaner).

CATALUÑA

- 1 ej., 28.01.2007, laguna de la Tancada, delta de l'Ebre (**Tarragona**) (Josep Tantull), junto a dos cisnes negros, flamencos y otras anátidas. Foto.
- 1 ej., macho, 17.06.2007, parque Diagonal Mar, **Barcelona** (Meritxell Aragonés). Foto.

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 01.2007, playa de la Almadraba (**Alacant**). Uno de ellos presente desde hace un año, procedente de los lagos del campo de golf de la playa de San Juan (comunicado por P. Guzmán). El 31.03 se observó 1 ej. en el mismo lugar (Elías Gomis). Foto.
- 2 ej., 26.10.2007, L'Estany, Cullera (**València**), presentes desde dos años antes, al menos desde el 14.08.2005 (Luis Aleixos Alapont).
- 1 ej., 11.2007, desembocadura del río Algar, en Altea (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento). Tiene apariencia mansa, dejando acercarse a menos de dos metros.

GALICIA

- Más de 20 ej., durante 2007, ría de **Pontevedra** (César Vidal). Se observaron 16 aves y al menos 4 jóvenes del año. Foto.



Cygnus olor.
Pontevedra, 2007.
Foto: César Vidal.

Cygnus atratus

cisne negro

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Originaria de Australia, Nueva Zelanda. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 2.

ANDALUCÍA

- 3 ej., 02.2007, La Janda (**Cádiz**) (Todor Todorov; Stephen Knapp). Foto.

CATALUÑA

- 2 ej., 01 y 28.01.2007, laguna de la Tancada, delta de l'Ebre (**Tarragona**) (Josep Tantull), junto a un cisne vulgar, flamencos y otras anátidas. Foto.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 18.06.2007, cerca de la desembocadura del Riu Sec (**Castelló**) (Gregorio Ros). Fotos.

Anser albifrons

ánsar careto

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

GALICIA

- 1 ej., ssp. *flavirostris*, primer invierno y luego mudando por completo, de 10.2006 a 03.2007, marisma de la Ramallosa, Baiona (**Pontevedra**) (César Vidal). Desde su aparición se acercaba a comer de la mano junto con otros ejemplares de *Cairina moschata*, *Aix galericulata* y *Branta canadensis*.

Anser anser var. domestica

ánsar doméstico

Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 06; Máx ind: 8.

CATALUÑA

- 1 ej., del 23.05 al 28.12.2002, desembocadura del Ridaura, Castell-Platja d'Aro (**Girona**) (Carlos Alvarez Cros). Foto.
- 3 ej., 06.10.2006, Parc Fluvial del Besòs (**Barcelona**) (Xavier Larruy). Se continuaron observando desde esa fecha y uno de ellos incluso hasta fin de año. Muy confiados, probablemente forman parte de los ejemplares introducidos en los parques de Barcelona.
- 1 ej., coloración blanca, de 12.2006 a 01.2007, desembocadura de la riera de Calonge (**Girona**) (Carlos Alvarez Cros, Miguel Ángel Domingo Santamaría). Foto.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 30.10.2007, Embalse de Amadorio, Orxeta (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento). Foto.

Anser indicus

ánsar indio

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria del centro de Asia.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05, 06; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 1 ej., del 10 al 19.09.2001, Gola del Ter, Torroella de Montgrí (**Girona**) (Albert Burgas Riera, Daniel Burgas Riera). Foto.

Branta sandvicensis **nueva**

barnacla nené ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Hawai.

CATALUÑA

- 1 ej., 25.01.2007, Pedralbes, **Barcelona** (Artur Degollada). Llevaba anilla del Zoo de Barcelona. Tras ser recapturado el ejemplar es devuelto al zoo. Se trata de la primera observación en libertad de la especie en España.

Branta canadensis

barnacla canadiense ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente).

Categoría: C* / – . Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 7; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 2.

GALICIA

- 1 ej., durante los años 2006 y 2007, bahía de Baiona (**Pontevedra**) (César Vidal). Larga estancia de este ejemplar en la bahía. Foto.



Branta canadensis.
Pontevedra, 2007.
Foto: César Vidal.

Branta leucopsis

barnacla cariblanca ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / D E3

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 04, 06; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 1 ej., 15.01.2006, Utxesa (**Lleida**) (Oriol Muntané, Ulises Ornstein, Toni Aparicio). No es seguro que se trate de un escape.
- 1 ej., adulto, del 31.05 al 01.06.2007, charca del centro comercial Carrefour, Sant Cugat del Vallès (**Barcelona**) (Antonio España). Foto. El 18.07 vuelve a observarse (Carles Furquet y Rosa de Dios). Foto.

Alopochen aegyptiaca

ganso del Nilo ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / –. Originaria de África. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 01, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 08.08.2007, marismas de Alventus, Trebujena, Doñana (**Cádiz**) (Fernando del Valle y Paco Chiclana). El 06.10 vuelve a observarse (Paco Chiclana). Foto.

CATALUÑA

- 1 ej., adulto, 06.04.2006, Estany del Cortalet, P.N. Aiguamolls de l'Empordà, Castelló d'Empúries (**Girona**) (Jordi Feliu). Probablemente el mismo ejemplar se observa el 26.04 en la depuradora de Empuriabrava, dentro del mismo Parque (Jordi Martí Aledo).
- 2 ej., 01.05.2006, desembocadura del río Tordera (**Barcelona/ Girona**) (Antonio Hernández Matías, José Manuel Arcos Pros, Jordi Prieto Mollar, Oriol Tello Monreal).
- 2 ej., 20.05 y 04.06.2006, Basses d'en Coll, Pals (**Girona**). Posiblemente los mismos ejemplares que son observados el 27.05 y el 04.06 en el cercano Estany de Boada, Palau-Sator (Ramon Fortià).
- 1 ej., 01.2007, desembocadura del río Tordera (**Barcelona/ Girona**) (Xavier Romera). El 22.01 aparece muerto.
- 1 ej., 24.01.2007, desembocadura del río Tordera (**Barcelona/ Girona**) (Xavier Romera), permaneciendo durante todo 02.2007. Es visto también posteriormente: el 25 o 26.02, junto a ánades reales y con aspecto muy confiado (Quique Carballal); el 18.03 (José Luis Copete y Eva Asensio); y el 20.03, última fecha de observación en la zona (Quique Carballal).
- 8 ej., 07.03.2007, estanys de Sils (**Girona**) (Lluís Motjé). El 22.03 se observa 1 ej. en el mismo lugar (Pedro Bescós y Mike O'Neill). Foto.
- 1 ej., 11.03.2007, río Segre, Vilanova de la Barca (**Lleida**) (Manel Torrelles).
- 1 ej., 29.04.2007, estany de Banyoles (**Girona**) (Núria Marjanedas y Xavier Clavell). Fotos.
- 2 ej., 19.05.2007, charca de les Llobateres, Sant Celoni (**Barcelona**) (Javier Mendoza). Presentes al menos durante todo 06.2007 y del 10.2007 al 12.2007 (Xavier Romera).
- 1 ej., 26.10.2007, río Ter, a su paso por la comarca de Osona (**Barcelona**) (Martí Rodríguez). La especie lleva por lo menos dos años reproduciéndose en la zona.



***Alopochen aegyptiaca*. Estany de Banyoles, Girona, abril 2007. Foto: Núria Marjanedas.**

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 09.2007, albufera de Gaianes (**Alacant**) (Vero Cortés). Foto.

Tadorna ferruginea

tarro canelo

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría:** A E2 / A E2 . Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 9.

ANDALUCÍA

- 1 ej., hembra, 29.12.2007, dehesa de Abajo, Puebla del Río (**Sevilla**) (Francisco Chiclana y Xurxo Pinheiro).

BALEARS

- 1 ej., 19.11.2007, playa de Cal Bassa, **Eivissa** (Juan M. Prats y Esteban Cardona). Foto.
- 1 ej., 14.12.2007, estanys de Sal Rossa, Ses Salines, **Eivissa** (Miguel Vericad). Observado también el 15.12 (Oliver Martínez).

COM. VALENCIANA

- Hasta 6 ej., principios de 2007, balsa de riegos de El Pontón, Requena (**València**): 5 ej. el 25.02 (Víctor Paris y Rafa Muñoz); 6 ej. el 12.03 (Rafa Muñoz Bastit); 2 ej. el 10.04 (Javier Armero Iranzo), el 16.04 (Rafa Muñoz Bastit) y el 22.04 (Rosa Rodrigo y Juan F. Marco). Los ejemplares vagan por las zonas húmedas de la comarca, y así se observaron también 4 ej. el 12.04 en el Embalse de Buseo (Javier Armero Iranzo). Estos ejemplares proceden de un escape del Parque "Naturaleza Ibérica" de El Rebollar (Requena) (Rafa Muñoz Bastit).

MADRID

- 2 ej., 23.04.2007, Paseo de las Delicias, **Madrid** (Christopher Smith). Fotos. Las aves se posaron en el tejado de un edificio.
- Grupo de ejemplares, 08.2007, embalse de Santillana, Manzanares el Real (**Madrid**) (comunicado por Antón Pérez). Foto.
- Nidificación durante 2007 en las lagunas del campo de golf de la dehesa, en Villanueva de la Cañada (**Madrid**), donde varias parejas llevan criando más de cinco años. Los ejemplares aparecen a mediados de abril y se marchan en septiembre (Juan Sagardia). Al menos una parte de los tarros canelos que se veían hace unos años en la provincia de Madrid provenían de los jardines del Campo del Moro, aunque actualmente el mayor foco es el Zoo de la Casa de Campo de Madrid, que posee docenas de parejas en semilibertad (Carlos Sánchez; Mario Roderó; Marcelino Martín).

Tadorna variegata **nueva**

tarro maorí

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Nueva Zelanda.

MADRID

- 1 ej., 11.09.2004, Valdemorillo (**Madrid**) (F. Barrio). Se trata de la primera observación de la especie en España.

Cairina moschata *var. domestica*

pato criollo

Especie (variedad) exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie originaria de Centro y Sudamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 20.

ASTURIAS

- 1 ej., 03.01.2007, puerto de El Musel, Gijón (**Asturias**), observado ya desde 12.2006 (Nacho Vega).

BALEARS

- 1 ej., 19.10.2007, torrent del Rec, Pollença (**Mallorca**) (Jordi Muntaner).
- 2 ej., machos, 08.12.2007, barranco de Son Fideu (**Menorca**) (Emili Garriga). Foto. En fechas anteriores había también 2 ej. hembras.

CATALUÑA

- 2 ej., 30.12.2006 a 07.01.2007, desembocadura de la riera de Calonge, Sant Antoni de Calonge (**Girona**) (Carlos Alvarez Cros, M. A. Domingo). Foto.
- 1 ej., 17.06.2007, río Besós, **Barcelona** (Jordi Clavell y Neus Gallardo).
- 1 ej., 08.11.2007, desembocadura del río Muga (**Girona**) (Jordi Martí Aledo).

COM. VALENCIANA

- Nidificación de una pareja durante 2007 en la desembocadura del Barranc de Carraixet, Alboraiia (**València**). Se observan 2 ej. el 30.03 y 1 ej. el 20.04 (Rafa Muñoz Bastit). El 01.05 aparece 1 ej. muerto, posiblemente predado por un gato (Rafa Muñoz Bastit y Juan Antonio Villena). El 28.08 se observa una pareja acompañada por 5 pollos y de nuevo los dos adultos del 28.10 al 09.11 (Rafa Muñoz Bastit). Fotos.
- 1 ej., blanco, 27.08.2007, Marjal de Rafalell i Vistabella (**València**) (Rafa Muñoz Bastit). Foto.

GALICIA

- 36 ej., con nidificación, durante 2007, entre la marisma de la Ramallosa y la Playa de Arealoura, Baiona/ Nigrán (**Pontevedra**). Existe una población residente de 36 ej. con cría confirmada en 2006 y 2007 (César Vidal).
- Nidificación durante 2007 en Junqueira de Alba y en Foz do Lagares (**Pontevedra**) (comunicado por Cosme Damián Romai).

PAÍS VASCO

- 1 ej., 09.02.2007, Getxo (**Bizkaia**) (Serafín Alarcón).



Cairina moschata.
Pontevedra, 2007.
Foto: César Vidal.

Callonetta leucophrys

pato acollarado ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 02, 05, 06; Máx ind: 5.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 08.11.2007, Racó de l'Olla, albufera de **València** (J. Ignacio Dies y Miguel Chardí). Foto. Se continúa observando el 25.11 (Máximo Sánchez Cobos), foto, y el 04.02.2008 (J. Ignacio Dies y Miguel Chardí).



Callonetta leucophrys. Albufera de València, noviembre 2007. Foto: Máximo Sanchez Cobos.

Aix sponsa

pato joyuyo ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), con reproducción registrada. **Categoría:** D E2 / E3 . Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 1.

CANTABRIA

- 1 ej., finales de 2007, río Ebro a su paso por Reinosa (**Cantabria**) (comunicado por Ricard Gutiérrez).

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 27.05 y 17.06.2007, parque Diagonal Mar, **Barcelona** (Meritxell Aragonés). Foto.

Aix galericulata

pato mandarín ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría:** C* E2 / E3 . Originaria del este de Asia. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

- 2 ej., machos, 16 al 22.02.2007, lagunas del Agia, el Padul (**Granada**) (Juan Ramón Fernández Cardenete; Luis Miguel Zaballa). Presentes desde hace menos de un mes (se hacen censos mensuales). En la misma localidad, se ve uno de ellos el 24.02 en las turberas del Padul (Luis Miguel Zaballa).
- 1 ej., hembra, 05.08.2007, balsa de riego en Mijas (**Málaga**) (Francisco Ríos y José A. Ríos).
- 1 ej., macho, 16.11.2007, embalse de Cubillas, Albolote (**Granada**) (José M. Tierno de Figueroa).
- 1 ej., macho, 05.12.2007, Río Grande (**Málaga**) (Todor Todorov). Foto.

BALEARS


- 1 ej., macho con plumaje en eclipse, 13.08.2007, campo de golf de Son Muntaner, Palma de Mallorca (Jordi Muntaner). Foto. Se vuelve a observar el 16.12. El ejemplar está presente en la zona quizás desde 2005.

CATALUÑA

- 1 ej., hembra, 1 y 11.12.2006, río Ter en Pedret (**Girona**) (Miguel Ángel Fuentes).
- 1 ej., macho, 01.04.2007, Illa de Ter (**Girona**) (Carles Pibernat).
- 1 ej., macho, 06.04.2007, Campdorà (**Girona**) (Narcís Rubio y Marta Palmada). Foto.
- 2 ej., 18.07.2007, charca del centro comercial Carrefour, Sant Cugat del Vallès (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios). Foto.
- 4 ej., 1 macho y 3 hembras, 25.11.2007, desembocadura del río Tordera, Malgrat de Mar (**Barcelona**) (Xavier Romera y David Caballé).
- 2 ej., machos, 28 y 31.12.2007, Illa de Ter (**Girona**) (Gerard Dalmau).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 25.01.2007, desembocadura del Barranc de Carraixet, Alboraià (**València**). Continúa presente el 09.11 (Rafa Muñoz Bastit; Daniel Domingo). Fotos. En València se han registrado 49 ejemplares desde 2003, la mayoría coincidiendo con el patrón de aves en otoño e invierno, siendo la mayoría machos (Rafa Muñoz). Existe un registro de nidificación en 2006 en la desembocadura del cauce nuevo del Túrria (F. Javier García Gans)



Aix galericulata.
Baiona,
Pontevedra, 2007.
Foto: César Vidal.

GALICIA

- 1 ej., macho adulto, de 10.2006 a 03.2007, marisma de la Ramallosa, Baiona (**Pontevedra**) (César Vidal). Foto.

Amazonetta brasiliensis *nueva*

pato brasileño ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

PAÍS VASCO

- 5 ej., 2 machos y 3 hembras, 13.11.2007, Getxo (**Bizkaia**) (Ivan Sarabia). El 19.11 continuaban 2 machos y 2 hembras (Serafín Alarcón). Foto. Se trata de la primera observación de la especie en España.



**Amazonetta brasiliensis. Getxo, Bizkaia, noviembre 2007.
Foto: Serafín Alarcón.**

Anas sibilatrix

silbón overo ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 02, 04, 05, 06; Máx ind: 2.

GALICIA

- 2 ej., invierno 2006/2007, enseada de San Simón, Vilaboa (**Pontevedra**) (Cosme Damian Romai).

Anas platyrhynchos var. domestica

ánade doméstico

Especie (variedad) doméstica observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.

Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 06; Máx ind: 106.

CANTABRIA

- Alrededor de 40 ej., durante 2007, río Ebro a su paso por Reinosa (**Cantabria**) (comunicado por Ricard Gutiérrez). Foto.

CATALUÑA

- 3-7 ej., durante 2007, desembocadura de la riera de Calonge, Sant Antoni de Calonge (**Girona**) (Carlos Alvarez Cros, M. A. Domingo). Foto. Presentes desde 2004.

COM. VALENCIANA

- 3 ej., 30.10.2007, Embalse de Amadorio, Orxeta (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento). Foto.

Anas poecilorhyncha

ánade picopinto

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria del este de Asia.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 06; Máx ind: 1.

CANARIAS

- 2 ej., 30 y 31.12.2006, Rosa del Taro (**Fuerteventura**) (Artur Degollada). En el anterior Noticiario se había citado un solo ejemplar.

Anas bahamensis

ánade gargantillo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 00, 03, 05, 06; Máx ind: 2.

ARAGÓN

- 1 ej., principios de 2007, lagunazo de Moncayuelo (**Zaragoza**), donde se observa de vez en cuando durante el invierno (Javier Traín).

NAVARRA

- 1 ej., 24.02.2007, laguna de Las Cañas (**Navarra**) (Oscar Gutiérrez), junto a otros patos. Foto.

RIOJA

- 1 ej., 2005 y principios de 2006, pantano de La Grajera (**La Rioja**) (Oscar Gutiérrez). Posiblemente el mismo ejemplar observado después en la vecina laguna de Las Cañas, Navarra.

Anas discors

cerceta aliazul

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A . Originaria de Norteamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

GALICIA

- 1 ej., 01.05.2007, la Xunqueira de Alba (**Pontevedra**) (Rafael Abuín). Foto. Individuo con carácter muy confiado. Se observa en fechas posteriores hasta por lo menos el 08.05 (Cosme Damián Romai).



Anas discors. Xunqueira de Alba, Pontevedra, mayo 2007. Foto: Cosme Damián Romai.

Anas cyanoptera

cerceta colorada ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / – . Originaria de América.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 04; Máx ind: 2.

RIOJA

- 1 ej., 18.12.2007, soto del Estajao, Alfaro (**La Rioja**) (Diego Benavides).

Anas rhynchos

pato cuchara australiano ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia, Nueva Zelanda.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 04; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 24.04.2002, P. N. dels Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**) (Luis José Salaverri, Jordi Martí Aledo). Foto.

Netta rufina

pato colorado ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 05, 06; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 3 ej., 19.07.2006, Parc Fluvial del Besòs, **Barcelona** (Xavier Larruy). Uno de los ejemplares se continuó observando hasta el 06.09. Con carácter muy confiado, probablemente forman parte de los ejemplares introducidos en los parques de Barcelona.

Netta peposaca

pato picazo ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

PAÍS VASCO

- 1 ej., durante 2007, puerto de Donosti (**Gipuzkoa**) (Manuel Chapa). Se observa de 01.2007 hasta por lo menos el 25.01.2008. Lleva anilla. Fotos.

Oxyura jamaicensis

malvasía canela ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría:** C* E2 / – . Originaria de América. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 02, 03, 05, 06; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., hembra o juvenil, 11.12.2007, Veta la Palma, Doñana (**Sevilla**) (comunicado por Carlos Gutiérrez).

CATALUÑA

- 1 ej., del 11.11 al 14.11.2007, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Lluís Gustamante; Ferran López, Héctor Garrido y otros). Foto.

PHASIANIDAE

Coturnix coturnix

codorniz común ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 25.02.2007, playa de Nules (**Castelló**) (Josep Bort). El ejemplar presenta deformaciones en las patas que podrían indicar que proviene de cautividad. Foto.

Phasianus colchicus

faisán vulgar ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / E3 . Originaria de Asia. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 48.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 04.03.2007, cerca de Can Batllia Nou, Sant Martí de Llémna (**Girona**) (Ponç Feliu, Josep Rost, Aleix Comas, Miguel Ángel Fuentes, Mercè Sánchez-Frou, Helena Perxachs y Ponç Feliu Jr.).
- Observaciones frecuentes durante 2007 en el delta del Llobregat (**Barcelona**) (Ferran López).

GALICIA

- 1 ej., macho, 01.10.2007, campos de cultivo de Oia (**Pontevedra**) (César Vidal).
- 2 ej., 10.2007, bosque de ribera de Godomar (**Pontevedra**) (César Vidal).

PAÍS VASCO

- Nidificación durante 2006 en los humedales de Salburua (**Álava**), verificada por segundo año consecutivo. El 18.07 se observó una hembra seguida de 8 pollos pequeños y el 26.08 otra hembra con 5 pollos pequeños. En los cotos cercanos se siguen realizando sueltas de esta

especie durante la temporada de caza, por lo que los ejemplares pueden verse reforzados por los supervivientes de estas sueltas que llegan hasta el humedal (información recopilada por Luis Lobo).

- Nidificación durante 2007 en los humedales de Salburua (**Álava**), verificada por tercer año consecutivo. En primavera se detectaron hasta seis territorios con machos cantando, observándose frecuentemente machos acompañados de hembras (hasta 4 hembras con un macho el 17.03). Aunque el número de polladas debe haber sido mayor, únicamente se registró una reproducción segura: el 17.08 se vio una hembra con 5 pollos medianos. Ya en invierno, se observaron agrupaciones de hasta 9 machos con 4 hembras (27.12) y se escucharon los primeros cantos (el primero el 21.01.2008). En los cotos cercanos se siguen realizando sueltas de esta especie durante la temporada de caza, por lo que los ejemplares pueden verse reforzados por los supervivientes de estas sueltas que llegan hasta el humedal (información recopilada por Luis Lobo).

Pavo cristatus

pavo-real común

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2** . Originaria de India. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06; Máx ind: indet.

BALEARS

- Más de 20 ej., durante 2007, varias zonas de **Menorca**. La especie parece estar estableciéndose en varias zonas de la isla, donde fueron observados grupos de más de 20 individuos durante 2007 (Lluc Julià).

CATALUÑA

- 1 ej., años 2005 o 2006, Tallades, Santa Cristina d'Aro (**Girona**) (Luis Luque, comunicado por Carlos Álvarez).

NUMIDIDAE

Numida meleagris

pintada común

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E3 / E1** . Originaria de África. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 07.06.2006, Torrevieja (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere).

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

pelicano común

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría: A E3 / –**

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 06; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 3 ej., 08.01.2001, Salina de Santa María, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) (Rafael García y Manuel Cabaco).
- 2 ej., 15.03.2004, Sierra de San Cristóbal, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) (Rafael García).

CICONIIDAE

Mycteria ibis

tántalo africano

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 04; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., adulto, 20.03.2007, playa de los Álamos (**Málaga**) (Salvador García).

CANARIAS

- 1 ej., 18.06.2007, Playa de Sotavento de Jandía (**Fuerteventura**) (Fernando Ávila), entre el Risco del Paso y el Hotel Meliá Los Gorriones, Costa Calma, Pájara. Lleva ya algunos años por la zona. Fotos. Observada nuevamente el 30.11 en Punta Matorral, Punta del Jable (Robin Mawer).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 14.08.2006, P.N. de la Marjal de Pegó-Oliva (**Alacant**) (José Llácer). Foto. El ejemplar procedía del Safari Park de El Vergel (**Alacant**).
- 1 ej., 14.02.2007, P.N de la Marjal de Pegó-Oliva (**Alacant**) (José Pablo Crespo Momiejo y Carlos Visera Verdú). Foto. Posteriormente se vió más al sur, en Benissà.
- 1 ej., adulto, 16.04.2007, albufera de **València** (Jose Luis Terrasa).
- 1 ej., 13.07.2007, marjal de Catarroja, albufera de **València** (Vicente Sargues). Foto.



Mycteria ibis. P.N. de la Marjal de Pegó-Oliva, Alacant, agosto 2006. Foto: José Llácer.

Leptoptilos crumeniferus

marabú africano ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / –. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 04; Máx ind: 2.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 30.09.2002, recogido en Arcos de la Frontera (**Cádiz**) y llevado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas "Dunas de San Antón" en El Puerto de Santa María (Rafael García).

THRESKIORNITHIDAE

Geronticus eremita

ibis eremita ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 05; Máx ind: 28.

ANDALUCÍA

- 3 ej., 10.12.2007, Utrera (**Sevilla**) (Juan Luis Muñoz). Los tres tienen anilla.

Threskiornis aethiopicus

ibis sagrado ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 5.

ANDALUCÍA

- 4 ej., 28.12.2007, embalse de Cubillas, Albolote (**Granada**) (Jesús Díez).

BALEARS

- 1 ej., adulto, 25.03.2007, rocas d'es Carnatge, Palma de **Mallorca** (Eduard Cuadrado). Al ser asustado vuela hacia s'Arenal.
- 1 ej., adulto, 29.03.2007, prat de Sant Jordi (**Mallorca**) (Josep Maria Tapia y Maribel Jiménez), foto. Observado nuevamente en el mismo lugar el 31.03 (Juan José Bazán), foto, y del 04 al 06.04 (Artur Degollada), foto.

CANARIAS

- 1 ej., 02.09.2007, Puerto de los Cristianos, Arona (**Tenerife**) (Alfredo Doncel Moratilla).
- 1 ej., 26.10.2007, Candelaria (**Tenerife**) (Miguel Ángel Cabrera). Foto. Llevaba una anilla y parecía algo manso.

CANTABRIA

- 1 ej., desde 01.2004 y durante los años siguientes hasta 2008, cola de la ría de Boó, marismas de Santoña (**Cantabria**) (José López Carrasco; Alejandro García Herrera). No tiene anilla.

CATALUÑA

- 1 ej., 01.07.2007, isla de Buda, delta del Ebro (**Tarragona**) (David Bigas).
- 1 ej., 15 y 21.10.2007, arrozales de Sant Carles de la Ràpita (**Tarragona**) (Carlos Domingo). Observado nuevamente en el mismo lugar el 15.11 y en fechas posteriores (David Bigas).
- 1 ej., primer invierno, 16.11.2007, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Armand Ramal, Sergi Bosch, Ferran López y otros). Foto. Sin anilla.

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 20.11.2007, El Hondo (**Alacant**) (Carlos Gutiérrez).

EXTREMADURA

- 2 ej., 20.12.2007, Villanueva de la Serena (**Badajoz**) (Chema Traverso y Jesús Porras).

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

flamenco del Caribe

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 05, 06; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 03.12.2006, delta de l'Ebre (**Tarragona**) (Oriol Cortés, Alex Omedes y Oriol Tello). Ejemplar ya presente en años anteriores. Foto.
- 1 ej., 03.02.2007, laguna de la Tancada, delta de l'Ebre (**Tarragona**) (Josep Tantull). Foto. Observado nuevamente en el mismo lugar el 04.04 (Miguel Castillo). Foto.

Phoenicopterus chilensis

flamenco chileno

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 31.10.2007, laguna de Villacañas (**Toledo**) (Ignacio Gámez). Foto. Observado nuevamente el 02.11 (Manuel Chapa y Ricardo Ramos).

Phoenicopterus minor

flamenco enano

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / D E3 . Originaria de África, India.
Ant. Noticiarios: Citas: 7; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 3.

ANDALUCÍA

- 7 ej., 03.2006, charcón de Fuentedepiedra (**Málaga**) (Antonio Miguel Pérez).
- Hasta 7 ej., principios de 2007, laguna de Fuentedepiedra (**Málaga**): 5 ej. el 17.02 (Francisco Chiclana); 1 ej. el 26.02 (Blas López); 6 ej. el 12.03, presentes ya desde una semana antes (Antonio Miguel Pérez); 5 ej. el 17.03 y 7 ej. el 21.04 (Francisco Chiclana). Se observó una cópula el 14.03 (Alfonso Roldán, comunicado por Juan Luis Muñoz). En años anteriores algún macho perseguía hembras de flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) sin éxito (Juan Luis Muñoz).

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 30.12.2006, Laguna Larga de Villacañas (**Toledo**) (Begoña Valcárcel y Sergio de Juan).

CATHARTIDAE

Coragyps atratus

zopilote negro

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de América.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

EXTREMADURA

- 1 ej., primavera/verano de 2007, muladar de Deleitosa (**Cáceres**) (John Muddeman; Juan Carlos Alfonso, fotos; comunicado por Javier Prieta). Ejemplar con pihuelas.

MADRID

- 1 ej., 09.01.2007, Griñón (**Madrid**) (Juan Vicente González Martín). Fotos. El ave llevaba pihuelas. Al parecer había sido observada ya dos días antes.

Cathartes aura

aura gallipavo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de América.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 02, 03, 05; Máx ind: 1.

CANARIAS

- 1 ej., 08.12.2007, Punta Matorral, Punta del Jable (**Fuerteventura**) (Robin Mawer).

GALICIA

- 3 ej., finales de 2007, **Pontevedra** y costa atlántica. Entre 08.2007 y 09.2007 se escaparon tres ejemplares de una colección de aves rapaces cerca de la ciudad de Pontevedra. Un ejemplar fue visto poco después en el espacio natural Complejo Ons- O Grove (O Grove/ Sanxenxo/ Meaño), donde los guardias intentaron capturarlo sin éxito. Tiempo después un ejemplar fue visto en Aveiro (**PORTUGAL**). El 12.12 se vio un ejemplar en la aldea de San Vicente do Grove, posado en un palo del tendido telefónico (Abrahám Padín). El 21.12 fue observado un ejemplar en Malpica (**A Coruña**) (Roberto Vidal Pazos), seguramente el mismo observado después en Roncudo (Amadeo Pombo). Así, los tres ejemplares escapados podrían corresponder a los observados recientemente en la zona de Aveiro, de O Grove/ A Guarda y de A Costa da Morte.

ACCIPITRIDAE

Haliaeetus vocifer **nueva**

pigargo vocinglero ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 1 y 14.01.07, cola del embalse de Cazalegas (**Toledo**) (Christophe Pontegnie). Fotos. Se trata de la primera observación de la especie en España.



Aegypius monachus

buitre negro ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CATALUÑA

- 1 ej., 09.11.2007, prados de Tres Ponts y cultivos de Sant Pere Pescador (**Girona**) (J. Torres y J.M. Arnau). Procedente de una liberación en Alinyà (**Lleida**).

Parabuteo unicinctus

busardo mixto ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 9; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., hembra, 25.03.2007, Son Serra, s'Albufera, Muro (**Mallorca**). No tenía pihuelas (Pere Vicens).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 28.10.2006, Dolores (**Alacant**). En la misma zona, fue observado 1 ej. el 22.12 en la laguna de la Mata y el 25.12 en Benejuzar (Marcos Ferrández Sempere).
- 1 ej., 17.02.2007, Marjal d'Almenara (**Castelló**) (Juan Ruiz y David Olmos).

- 1 ej., 15.03.2007, calle Juan Llorens, **València** (Emilio Martín), con pihuelas. Foto. Observado nuevamente el 31.03 en el barrio de Russafa, antes de lanzarse a volar en círculos sobre una bandada de unas 50 palomas e intentar tres ataques sin éxito (Francisco Gresa). Fotos. El ave fue recapturada por su dueño el 27.04 (comunicado por Toni Polo).



***Parabuteo unicinctus*.**
València, marzo 2007.
Foto: Emilio Martín.

Geranoaetus melanoleucus

águila mora ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 07.06.2007, zona del faro de Formentor (**Mallorca**) (Joan Mayol y Jordi Muntaner).

Aquila chrysaetos

águila real ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / – . Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., adulto, 13.03.2007, camino de Ses Puntes, s'Albufera, Muro (**Mallorca**) (Pere Vicens). Tiene dos pihuelas o correas largas en las patas. Volvió a verse en el mismo lugar 1 ej. el 30.04 (Miquel Àngel Dora), foto. También más tarde 1 ej. el 14.10 (Pere Vicens).

Otras especies utilizadas en cetrería, con escapes registrados:

Buteo regalis

busardo herrumbroso

(Norteamérica, **Categoría:** E3 / –)

Buteo jamaicensis

busardo colirojo

(Norte y Centroamérica, **Categoría:** – / –)

Accipiter gentilis

azor común

(Nativa, **Categoría:** A E3 / D)

FALCONIDAE

Falco cherrug

halcón sacre

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de este de Europa, Asia. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 06; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., inmaduro, 16.03.2007, punta del Molí, Palamós (**Girona**) (Miguel Ángel Domingo). El ejemplar llevaba pihuelas.

Falco biarmicus

halcón borní

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A . Utilizada en cetrería, con escapes registrados.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 05; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., macho joven, 19.03.2004, Salina de la Tapa, R. N. Bahía de Cádiz, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) (Rafael García).

Otras especies utilizadas en cetrería, con escapes registrados:

Falco columbarius	esmerejón	(Nativa, Categoría: A / A)
Falco tinnunculus	cernícalo vulgar	(Nativa, Categoría: A / A)
Falco peregrinus	halcón peregrino	(Nativa, Categoría: A E3 / –)
Falco rusticolus	halcón gerifalte	(Nativa, Categoría: A E3 / –)
Falco sparverius	cernícalo americano	(América, Categoría: E3 / –)
Falco subbuteo	alcotán europeo	(Nativa, Categoría: A / –)
Falco femoralis	halcón aleta	(América, Categoría: E3 / –)

GRUIDAE

Balearica regulorum

grulla coronada cuelligrís

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06; Máx ind: 2.

BALEARS

- 1 ej., 24.02.2007, depuradora de s'albufera de Muro (**Mallorca**) (José Amengual y Damià Jaume), volando pesadamente y graznando. Está presente desde 2006. Observada nuevamente el 02.02.2008 (José Llabrés). Foto. En un principio hubo dos ejemplares, pero uno de ellos fue abatido (comunicado por J.C. Fernández-Ordóñez).

CANARIAS

- 1 ej., de especie sin identificar pero perteneciente a *B. pavonina* o *B. regulorum*, 08.12.2007, Punta Matorral, Punta del Jable (**Fuerteventura**) (Robin Mawer).



Balearica regulorum.
Albufera de Muro,
Mallorca,
febrero 2008.
Foto: José Llabrés.

RALLIDAE

Porphyrio alleni **nueva**

calamoncillo africano ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / A . Originaria de África.

ANDALUCÍA

• 1 ej., 04.01.2007, El Rocío (**Huelva**) (Paco Chiclana y Mario Martín). Foto. Al parecer ya estaba presente desde mediados de 12.2006. Ejemplar con primarias rotas en ambas alas, faltándole algunas secundarias en el ala izquierda y carácter confiado (Juan Sagardia), probablemente procedente de un núcleo zoológico cercano donde tienen ejemplares sin anillar. Fue recapturado el 23.01, posiblemente por sus antiguos propietarios. Se trata de la primera observación de esta ave en España como especie introducida (conocida anteriormente sólo como divagante natural).

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus mexicanus *nueva*

cigüeñuela americana ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de América.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., con anilla metálica en la tibia izquierda, 11.12.2007, Racó de l'Olla, albufera de València (José-Ignacio Dies). Fotos. Nuevamente observada el 16.12 (Rosa Rodrigo y Juan F. Marco). Se trata de la primera observación de la especie en España.



Himantopus mexicanus (ejemplar del centro). Albufera de València, diciembre 2007. Foto: José-Ignacio Dies.

CHARADRIIDAE

Vanellus armatus

avefría armada ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** – / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06; Máx ind: 1.

CANARIAS

- 1 ej., durante 2007, El Fraile (Tenerife). El ejemplar, presente ya desde el 11.04.2006 (Thorsten Krüger), sigue observándose el 16.02.2007 (Gustavo Peña) y hasta enero de 2008 (comunicado por Juan Sagardía y Gustavo Peña). Fotos. Al parecer se importaron 10 ej. a la

isla de Tenerife en 2005 (comunicado por Juan José Ramos Melo al CR-SEO), aunque no constaba que ninguno de ellos hubiera escapado.



**Vanellus armatus. El Fraile, Tenerife, febrero 2007.
Foto: Gustavo Peña.**

COLUMBIDAE

Columba livia var. domestica

paloma doméstica ■

Especie (variedad) doméstica establecida. **Categoría: C / C**. Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ESPAÑA

- Especie (variedad) establecida y con distribución generalizada por todo el territorio, especialmente en los núcleos urbanos.

Streptopelia roseogrisea var. risoria

tórtola doméstica ■

Especie (variedad) exótica establecida. **Categoría: C / C**. Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie originaria de África, Arabia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 04, 05; Máx ind: 2.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 14.08.2007, urbanización Gran Alacant, Santa Pola (**Alacant**) (Óscar Aldeguer).

Oena capensis

tortolita rabilarga ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de África, Arabia.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCÍA

- 1 ej., macho adulto, 02.05.2007, río Guadalhorce (**Málaga**) (Keith Taylor, comunicado por Dave Flumm).

Geopelia cuneata

tortolita diamante ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 02, 03, 05, 06; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 17.08.2007, R. N. del delta del Llobregat (**Barcelona**) (Miquel Domènech). Fotos.

EXTREMADURA

- 1 ej., 18.02.2007, entrada por carretera de Trujillo-Zorita, Plasencia (**Cáceres**) (Miguel Angel Muñoz "Memole", Eva Palacios Rodriguez y Francisco Ramirez Tornero). Foto.



***Geopelia cuneata*. R.N. del delta del Llobregat, Barcelona, agosto 2007. Foto: Miquel Domènech.**

CACATUIDAE

Nymphicus hollandicus

cacatúa ninfa

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2**. Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 05, 06; Máx ind: 7.

ANDALUCÍA

- 1 ej., leucístico, 13.03.2007, vías de maniobras del tren, Lora del Río (**Sevilla**) (José María Cano). Lleva una anilla amarilla. Fotos.
- 1 ej., 06.08.2007, Torremolinos (**Málaga**) (Andy Paterson).
- 1 ej., 03.10.2007, urbanización Guadalmar, al lado del río Guadalhorce (**Málaga**) (Ángel García López y Andy Paterson).



***Nymphicus hollandicus* (parte de coloración albina).**
Lora del Río, Sevilla, marzo 2007. Foto: José María Cano.

BALEARS

- 1 ej., 09.06.2007, Son Roqueta, Palma de **Mallorca** (Jordi Muntaner).

CATALUÑA

- 1 ej., fenotipo silvestre, 04.03.2007, Can Fabra, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell y Neus Gallardo).
- 1 ej., 14.03.2007, Figuerola del Camp (**Tarragona**) (Francesc Sardà e Inés Sánchez).
- 1 ej., 05.04.2007, río Ter, Sant Julià de Ramis (**Girona**) (Narcís Rubio). Foto.
- 1 ej., 11.05.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell).
- 1 ej., macho, 18.05.2007, Hotel Don Cándido, Terrassa (**Barcelona**) (Miquel Rafa).
- 1 ej., 20.05.2007, Can Gener, Riudellots de la Selva (**Girona**) (comunicado por Ponç Feliu).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho adulto, 30.07.2004, Vinaròs (**Castelló**) (Enrique Luque López).
- 1 ej., 23.03.2006, Elx (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere).
- 1 ej., 15.05.2007, Almàssera (**València**) (Rafa Muñoz). Foto.
- 1 ej., 25.11.2007, arrozales de Corbera, albufera de **València** (Antoni Polo).

PSITTACIDAE

Platycercus elegans

perico elegante

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 05; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 27.12.2007, la Volta, Lliria (**València**) (Josep Portolés y Antoni Polo).

Platycercus eximius

perico multicolor

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 26.03.2006, recapturado en **Alacant** (comunicado por Luis Fidel Sarmiento).

MADRID

- 1 ej., 25.02.2007, Parque de la Paz, Alcorcón (**Madrid**). Presente en fechas anteriores desde 07.2006 (Alberto Villares Fernández).

Psephotus haematonotus

perico dorsirrojo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 07.03.2007, San Vicente del Raspeig (**Alacant**) (comunicado por Luis Fidel Sarmiento). Fotos.

Barnardius zonarius **nueva**

perico de Port Lincoln

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.

CATALUÑA

- 1 ej., ssp. *semitorquatus*, 07 al 20.11.2007, Bellaterra (**Barcelona**). También vista en fechas anteriores y posteriores (Josep del Hoyo). Foto. Se trata de la primera cita de la especie en España.



Barnardius zonarius.
Bellaterra, Barcelona, 2007.
Foto: Josep del Hoyo.

Melopsittacus undulatus

periquito común

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2**. Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., color amarillo, 16.05.2007, urb. L'Argentina, Alaior (**Menorca**) (Emili Garriga). Fotos.

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 19.10.2007, Tarancón (**Cuenca**) (José M. Herranz Fernández). Foto.

CATALUÑA

- 2 ej., 01.07.2007, camp de la Barraca, Molins de Rei (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios). Foto.
- 1 ej., 17.07.2007, Zoo de **Barcelona** (Xavier Tomàs).
- 1 ej., 06.10.2007, Illa de Ter, **Girona** (Narcís Rubio). Foto.
- 1 ej., 10.12.2007, río Mogent, Vilanova del Vallès (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 26.07.2006, Guardamar (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere).
- 1 ej., 19.08.2007, Elx (**Alacant**) (Óscar Aldeguer Peral).

PAÍS VASCO

- 1 ej., 29.08.2007, Bilbao (**Bizkaia**) (Serafín Alarcón).

Psittacula krameri

cotorra de Kramer

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de África, India. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 02, 03, 04, 05, 06; **Máx ind:** 17.

ANDALUCÍA

- 7 ej., principios de 01.2007, Jardín Botánico, **Córdoba** (Luis M. Zaballa). Foto.
- 2 ej., 03.03.2007, Jardines del Alcázar, **Córdoba** (Andrew Paterson).
- 7 ej., 03.10.2007, en un parque urbano de **Cádiz** (Nacho Vega).

ASTURIAS

- Hasta 16 ej. durante 2007 en el parque Isabel la Católica, Gijón (**Asturias**): 7 ej. el 11.01, 4 ej. el 13.01, 4 ej. el 17.01 (Nacho Vega); 7 ej. el 21.01 (Manuel Quintana y Conchi O. Ania); 6 ej. el 29.01, 2 ej. el 30.01, 5 ej. el 18.02 (Nacho Vega); 16 ej. el 14.10 (Juan Bueno); 3 ej. el 29.11, 3 ej. el 23.12 (Nacho Vega).
- 1 ej., 01.11.2007, Peroño, Gozón (**Asturias**) (Manuel Quintana y Pablo Menéndez).

BALEARS

- 2 ej., 08.04.2006, predio de Son Pax, Palma de **Mallorca**. Se vuelven a ver el 05.06. Previamente se había visto un ejemplar el 19 y 20.02 (Rafel Mas).
- 3 ej., 08.03.2007, predio de Son Pax, Palma de **Mallorca**. Se vuelven a ver 2 ej. el 05.10 y el 24.10 y 1 ej. el 10.12 (Rafel Mas).
- 2 ej., 05.04.2007, paseo marítimo de Palma de **Mallorca** (Artur Degollada).

CATALUÑA

- Numerosas observaciones durante todo el 2006 en el Parc del Guinardó, **Barcelona**, con máximos de 3 ej. los días 09.07 y 01.10 (Xavier Batllori).
- Alrededor de 20 ej., 07.12.2006, parque de la Ciutadella, **Barcelona** (Unai Fuente, Justina Pérez y Marina C. Gómez).
- 1 ej., 27.12.2006, Parc del Migdia, **Girona** (Josep Rost).
- Entre 7 y 9 ej., de 07.2006 a 02.2007, Manresa (**Barcelona**) (Antoni Borràs).
- Observaciones de hasta 6 ej. durante todo el 2007 en la ciudad de **Girona**: 2 ej. el 03.01, la Devesa (Josep Rost); 2 ej. el 08.01, escuchados en la plaça Salvador Espriu, 2 ej. el 12.01, escuchados en la plaça del Vi, 1 ej. el 02.02, la Devesa (Ponç Feliu); 1 ej. el 06.02, la Devesa (Lluïsa Bonal, Sílvia Teixidor y Dolors Garcia); 1 ej. el 08.02, plaça del Vi (Ponç Feliu); 1 ej. el 13.02, Escola d'Hosteleria (Ponç Feliu y otros); 6 ej. el 11.06, pont de Pedra (Alfons Delgado); 1 ej. el 30.07, calle Emili Grahit (Ponç Feliu, Xavier Vázquez y Marc Real); 3 ej. el 14.08 y 2 ej. el 31.08, la Devesa (Ponç Feliu).
- Unas pocas parejas, con observaciones de hasta 9 ej. durante todo el 2007 en Sant Joan Despí (**Barcelona**). Posibles nidos en *Platanus* sp. (Jordi Clavell).
- Hasta 3 ej. durante 2007 en la desembocadura del río Tordera, entre Malgrat de Mar y Blanes (**Barcelona/ Girona**). El 28.01 se observan 2 ej. (Xavier Romera). El 04.02 se observan 3 ej. (Cristina Prieto y Jordi Sala). El 22.02 se observan 2 ej. alimentándose de brotes de *Populus alba*. Foto. El 18.03 se observan 3 ej., registrándose una cópula. Foto. Más tarde, el 14.10 se observa 1 ej. (Xavier Romera). Posiblemente sean los mismos ejemplares observados en las poblaciones de Tordera y Malgrat de Mar.
- 15 ej., 21.02.2007, parque de la Mariona, Molins de Rei (**Barcelona**), volando dirección NO, hacia la Serra de Collserola (Carles Furquet y Ramon Furquet).
- 2 ej., registrándose cópula, 11.03.2007, árboles del Zoo de **Barcelona** (Xavier Tomàs).
- 2 ej., macho y hembra, 14.03.2007, hospital de l'Esperit Sant, Badalona (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez y Mercè Loukota).
- 2 ej., macho y hembra, tienen nido en un álamo blanco (*Populus alba*), 30.03.2007, Malgrat de Mar (**Barcelona**) (Xavier Romera). Foto.
- 2 ej., 30.03.2007, centro de la población de Tordera (**Barcelona**) (Xavier Romera).
- 1 ej., macho, 17.05.2007, Creu de Pedralbes, **Barcelona** (J.C. Fernández-Ordóñez y Pedro Bescós).
- 3 ej., 03.06.2007, Federació Obrera, Molins de Rei (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios).
- 1 ej., 20.09.2007, el Poal (**Lleida**) (Joan Estrada).

- 3 ej., 02.10.2007, la Ricarda, delta del Llobregat (**Barcelona**) (Ferran López).
- 5 ej., 27.10.2007, Gallecs, Mollet del Vallès (**Barcelona**) (Antonio Rodríguez Sinovas).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., 05.06.2004, Vila-real (**Castelló**) (Josep Bort Cubero).
- Hasta 8 ej. durante el 2004 en **Castelló**: 5 ej. el 20.06, 6 ej. el 27.09, 8 ej. el 24.10 (Xavier Barreda).
- 7 ej., 16.11.2005, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).
- 6 ej., 9.1.2006 Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).
- Unas pocas parejas, todo el 2007, parque Ribalta, **Castelló** (Xavier Barreda).
- 4 ej., 17.12.2007, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).
- 7 ej., 18 o 19.04.2007, Ermita de Vera, junto a la Universitat Politècnica de **València** (Pepe Greño).
- 2 ej., 15.05.2007, sobrevolando la V-21, Alborai (València) (Rafa Muñoz).
- 2 ej., 10.10.2007, partida Patos, Marjalera, **Castelló**. Se observan también el 23.10, 13.11 y 27.11. Ya se había observado previamente 1 ej. el 25.09 (Xavier Barreda).

GALICIA

- 1 ej., 31.03.2005, P.N. Corrubedo, Ribeira (**A Coruña**) (Manuel Polo).
- 2 ej., 09.01.2006, Boiro (**A Coruña**). No se descarta que haya un pequeño núcleo reproductor (Manuel Polo).
- 1 ej., 07.2006, P.N. Corrubedo, Ribeira (**A Coruña**) (Manuel Polo).
- 1 ej., macho, todo el 2007, jardines de Méndez Núñez y parque de Santa Margarita, **A Coruña** (Amadeo A. Pombo y Mariana Roura).

MADRID

- 1 ej., 22.12.2007, Paseo Imperial, **Madrid** (Marcelino Martín).

Agapornis roseicollis

inseparable de Namibia

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 2.

ASTURIAS

- 3 ej., 02.2007, Venta las Ranas, Villaviciosa (**Asturias**) (comunicado por Adolfo Villaverde). Video.

CATALUÑA

- 1 ej., 10.05.2007, calle Lluís Companys, el Papiol (**Barcelona**) (Carles Furquet).
- 1 ej., var. amarilla, 20.06.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell y Neus Gallardo). Foto. Recapturado.
- 1 ej., coloración verde, 29.09.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell y Neus Gallardo).
- 1 ej., 21.11.2007, Premià de Dalt (**Barcelona**) (Jaume Castellà). Fotos.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 05.09.2006, San Juan (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere).
- 1 ej., 07.03.2007, inmediaciones del Centro de Recuperación de Santa Faz (**Alacant**) (comunicado por Luis Fidel Sarmiento).

Agapornis fischeri

inseparable de Fischer

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05, 06; Máx ind: 7.

ANDALUCÍA

- 10 ej., 04.2007, Ciudad Jardín, **Málaga** (Juan Antonio Campos Palomo). Al parecer, llevan ya dos años por la zona.

Agapornis sp.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 09.04.2007, Camí de les Fonts, Alboraià (**València**) (Pepe Greño).

Poicephalus senegalus

lorito senegalés

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 4.

CATALUÑA

- 1 ej., 18.03.2006, jardines del Palau Reial de Pedralbes, **Barcelona** (Xavier Batllori).
- 1 ej., ssp. *senegalus*, 19.01.2007, puerto de Palamós (**Girona**) (Miguel Ángel Domingo).
- 2 ej., 14.03.2007, barrio de La Marina, **Barcelona** (Pere Abelló).
- 1 ej., 15.03.2007, jardines del Hospital de Sant Pau, **Barcelona** (Xavier Tomàs).
- 1 ej., 10 y 30.06.2007, Gavà Platja (**Barcelona**) (Lázaro Garzón).

COM. VALENCIANA

- 4 ej., los días 23.09.2005 y 12.10.2005, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar. Además se encuentra un individuo muerto, ahogado en una fuente, el 22.08.2005 y se anilla otro el 19.12.2005 (Pepe Greño Ruiz).
- 3 ej., 02.01.2006, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).
- 1 ej., 19.05.2006, **Alacant** (Marcos Ferrández Sempere).

Psittacus erithacus

loro yaco

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 05; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 11.07.2007, recapturado en Alfaz del Pi (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento). Foto.

MURCIA

- 1 ej., 19.10.2006, Isla Grosa, San Javier (**Murcia**) (Ángel Sallent).



Psittacus erithacus. Alfaz del Pi, Alacant, julio 2007. Foto: Luis Fidel Sarmiento.

Ara ararauna

guacamayo azulamarillo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 02; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 17.05.2006, autovía de Castelldefels, Bellvitge (**Barcelona**) (Jacint Nadal; comunicado por Xavier Ferrer).

Diopsittaca nobilis

guacamayo noble

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 05, 06; Máx ind: 1.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 30.04.2007, Jardín Botánico de **València** (Pepe Greño y Pablo Vera). Seguramente se trata del ejemplar ya presente desde 2005.

Aratinga acuticaudata

aratinga cabeciazul

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / E3 . Originaria de Sudamérica.
 Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 6.

ANDALUCÍA

- 4 ej., 07.10.2007, Torremolinos (**Málaga**) (Andy Paterson). Fotos.

BALEARS

- 2 ej., 23.03.2007, torrent de na Borges, Artà-Santa Margalida (**Mallorca**) (Antoni Muñoz y Cati Artigues). Foto.

CANARIAS

- 2 ej., 18.03.2007, Jardines Buenavista, Las Palmas de **Gran Canaria** (Tony Sánchez). Foto.

CATALUÑA

- 1 ej., inmaduro, 13.02.2007, cruce calles Nàpols/ Provença, **Barcelona** (Jaume Campderròs).
- 2 ej., 27.02.2007, parc de Vallparadís, Terrassa (**Barcelona**) (Joan Carles Fernández-Ordóñez). Foto.
- 8 ej., 01.04.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell). En el mes anterior se observaron grupos de 3 ejemplares.
- 1 ej., 20.05.2007, parque de Can Falguera, Sant Feliu de Llobregat (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios).
- 2 ej., 10.06.2007, Gavà Platja (**Barcelona**) (Lázaro Garzón).
- 2 ej., 23.06.2007, parque Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios).
- 1 ej., 15 y 21.07.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell).
- 1 ej., 21.08.2007 y 25-26.08.2007, Tallades, Santa Cristina d'Aro (**Girona**) (Carlos Alvarez). Foto.
- 2 ej., 02.09.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell).
- 2 ej., 31.12.2007, barrio de Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell).

Aratinga wagleri

aratinga de Wagler

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 03; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., de la ssp. *frontata* o *minor*, 16.08.2007, Mijas Costa (**Málaga**) (Teo Todorov). Fotos.

Aratinga mitrata

aratinga mitrada

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / -**. Originaria de Sudamérica.
 Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 05, 06; Máx ind: 50.

CATALUÑA

- 1 ej., 07.01.2006, La Pineda, Salou (**Tarragona**) (Albert Cama, Abel Martín Oribe y Isabel Sancho Avelló).
- 24 ej., 25.02.2006, jardines del Laberint, **Barcelona** (Xavier Batllori).
- 2 ej., 03.2006 y fechas posteriores, Manresa (**Barcelona**) (Xavier Colomé).
- 38 ej., 12.03.2006, Parc del Guinardó, **Barcelona** (Xavier Batllori).
- 52 ej., 30.01.2007, Parc de la Ciutadella, **Barcelona** (Jordi Clavell).
- Alrededor de 50 ej., 22.02.2007, la Floresta (**Barcelona**), comiendo flores de almendro (Antoni Ricart). Foto.
- 6 ej., 12 y 22.03.2007, Sant Andreu, **Barcelona** (Jordi Clavell).
- Hasta 5 ej., durante todo el año 2007, jardines del Hospital de Sant Pau, **Barcelona** (Xavier Tomàs). El 02.04.2007 se vieron 8 ej., pero no se puede descartar que fueran *A. erythrogenys*.
- 2 ej., 24.06.2007, Vilafortuny, Cambrils (**Tarragona**) (Carles Tubella). No se puede descartar que fueran *A. erythrogenys*.
- 2 ej., 30.06.2007, Gavà Platja (**Barcelona**) (Lázaro Garzón).

Aratinga erythrogenys

aratinga de Guayaquil

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / -** . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 03, 05, 06; Máx ind: 40.

COM. VALENCIANA

- 36 ej., los días 12.10.2005 y 31.10.2005, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar. Además, el 31.10.2005 se observa que el grupo incluye 3 pollos, sin apenas coloración roja en la cabeza y cuidados constantemente por un adulto (Pepe Greño Ruiz).
- 40 ej., 09.01.2006, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).
- 12 ej., 20.02.2007, próximas al Parque de La Canaleta, Mislata (**València**) (M. Carmen Plá Almenar).
- 23 ej., 24.12.2007, Jardín Botánico de **València**. Presentes durante todo el año, con diversas observaciones de menor número en el mismo lugar (Pepe Greño Ruiz).

Aratinga leucophthalmus

aratinga ojiblanca

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3** . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 05; Máx ind: 3.

CATALUÑA

- 4-5 ej., 10.06.2007, Gavà Platja (**Barcelona**) (Lázaro Garzón). El 30.06, observados 3 ej. en la misma zona.

Nandayus nenday

aratinga ñanday

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2** . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 05, 06; Máx ind: 2.

CANARIAS

- 2 ej., 17 a 19.07.2007, Parque de la Granja, Santa Cruz de **Tenerife** (Nereida Herrera del Castillo y Benito González Nuñez). Foto.

CATALUÑA

- 1 ej., 15.02.2007, parque Joaquim Balcells, **Barcelona**, acosaba a las cotorras argentinas (*Myiopsitta monachus*) que anidan en el parque (Daniel Boronat).
- 2 ej., 24.03 y 26.04.2007, Paseo Pujades/ Ciutadella, **Barcelona** (Xavier Tomàs).
- 1 ej., 04.11.2007, Tordera (**Barcelona**) (Xavier Romera). Fotos.
- 4 ej., 19.12.2007, Zoo de **Barcelona** (Josep Garcia y J.C. Fernández-Ordóñez). Foto.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 06.10.2007, Partida Patos, Marjaleria, **Castelló** (Xavier Barreda). Foto.
- 1 ej., 21.10.2007, Racó de L'Olla, L'Albufera de **València** (Toni Polo Aparisi, Pascual López López, Rafa Muñoz Bastit, Clara García Ripollés, José Luis Terrasa Nebot, Pedro Ángel del Baño Moreno).

Cyanoliseus patagonus

loro barranquero

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 8.

BALEARS

- 1 ej., 30.05.2007, sobrevolando la autopista, entre Santa Maria y Consell (**Mallorca**) (Juan José Bazán).
- 1 ej., 30.05.2007, sobrevolando la autopista, cerca de Binissalem (**Mallorca**) (Juan José Bazán).

CATALUÑA

- 1 ej., 22.10.2007, cruce de avenidas Carles III y Diagonal, **Barcelona** (Ricard Gutiérrez).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 30.05.2004, Tales (**Castelló**) (José V. Bort). Recapturada al cabo de unos días.

GALICIA

- 1 ej., 14.03.2005, la Alameda, Chapela, Redondela (**Pontevedra**) (Luis Álvarez). Foto.

MADRID

- 6 ej., 06.2007, Parque de Atracciones, Casa de Campo, **Madrid** (Raúl Alonso).

MURCIA

- 4 ej., 03.03.2006, Cabo de Palos, Cartagena (**Murcia**) (Ángel Sallent y José Luis Murcia). Foto.
- 1 ej., 27.05.2007, La Azohía, Cartagena (**Murcia**) comiendo almendras (Diego Zamora). Foto.



Cyanoliseus patagonus. Cartagena, Murcia, marzo 2006. Foto: Ángel Sallent.

Myiopsitta monachus

cotorra argentina

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 40.

ANDALUCÍA

- 8 ej., 16.11.2000, parque periurbano Dunas de San Antón, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) (Rafael García).
- 6 ej., 13.03.2001, parque periurbano Dunas de San Antón, El Puerto de Santa María (**Cádiz**). Más tarde, el 31.10 se ven 10 ej. (Rafael García).
- 5 ej., 05.08.2002, parque periurbano Dunas de San Antón, El Puerto de Santa María (**Cádiz**). En la misma localidad, el 14.10 se ven 9 y 6 ej. en la urbanización Vistahermosa (Rafael García).
- 2 ej. y 1 nido, 31.03.2004, urbanización Vistahermosa, El Puerto de Santa María (**Cádiz**). Más tarde, el 03.11 se ven 4 ej. (Rafael García).
- 9 ej. 14.11.2006, parque periurbano Dunas de San Antón, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) (Rafael García).
- 1 ej., juvenil, 19.03.2007, Víznar (**Granada**) (Jorge Garzón).

BALEARS

- 2 ej., 10 y 13.04.2006, predio de Son Pax, Palma de **Mallorca** (Rafel Mas).
- 8 ej., 05.04.2007, paseo marítimo, Palma de **Mallorca** (Artur Degollada).
- 6 ej., 05.10.2007, predio de Son Pax, Palma de **Mallorca** (Rafel Mas).
- 1 ej., 26.10.2007, ses Argiles, Sóller (**Mallorca**) (Samuel Pinya). Hacía un par de meses que no se veía ninguna por la zona.

CATALUÑA

- Entre 10.2004 y 12.2004, presencia de ejemplares en Ripoll (**Girona**) (Pau Ortiz). Fotos.
- 2 ej., 07.01.2006, La Pineda, Salou (**Tarragona**) (Albert Cama, Abel Martín Oribe y Isabel Sancho Avelló).
- Al menos 23 ej., 03.01.2007, Pla de Grau, Malgrat de Mar (**Barcelona**). El 04.03 se observaron 19 ej. Foto. El 23.11 se observaron 25 ej. También se observaron 5 ej. el 04.01 en el cruce de Palafolls, en la misma localidad (Xavier Romera).
- 60 ej., 08.01.2007, plaza de les Glòries, **Barcelona** (Xavier Tomàs).
- 2 ej., 25.01.2007, núcleo urbano de El Prat de Llobregat (**Barcelona**) (Ángel Fernández).
- 2 ej., 03.03.2007, mercado Martí l'Humà, Terrassa (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez). Primera observación en la zona.
- 15 ej., 08.03.2007, plaza Pompeu Fabra, Molins de Rei (**Barcelona**) (Carles Furquet, Ramon Furquet y Rosa de Dios).
- 2 ej., 11.03.2007, Cunit (**Tarragona**). Más tarde, el 02.06 se observan 6 ej. (Antonio Rodríguez Sinovas).
- 7 ej., 16.04.2007, sobrevolando la urbanización Mas Mora, Tordera (**Barcelona**) (Xavier Romera).
- 2 ej., 11.06.2007, desembocadura del río Tordera (**Barcelona/ Girona**) (Xavier Romera). Más tarde, el 19.11 se observan 25 ej. (Enric Badosa).
- 10 ej., 23.07.2007, parque Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat (**Barcelona**) (Carles Furquet y Rosa de Dios). Foto.
- Más de 40 ej., 24.11.2007, sobrevolando la autopista AP-7, Cerdanyola del Vallès (**Barcelona**) (Carles Furquet).
- Durante todo el 2007 se realizan observaciones frecuentes en el delta del Llobregat (**Barcelona**) (Ferran López).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., al menos entre 09.2006 y 01.2007, L'Olleria (**València**) (Pepe Ruiz Sanchis).
- 2 ej., 17.02.2007, Alcalalí, La Marina Alta (**Alacant**) (Víctor París y Toni Polo).
- 2 ej., 17.04.2007, Almàssera (**València**), alimentándose de los frutos de un cinamomo (*Melia azedarach*) en el patio de un colegio. Entre Alboraya y Almàssera, se observó también 1 ej. el 20.04 en la desembocadura del Barranc de Carraixet y zonas próximas (Rafa Muñoz Bastit).
- 1 ej., 25.04.2007, Avenida del Puerto, **València**, alimentándose de los frutos de un cinamomo (*Melia azedarach*) (Rafa Muñoz Bastit).

GALICIA

- Al menos 12 ej., durante 2006, en Noia (**A Coruña**), en un parque con palmeras, sin llegar a comprobarse la reproducción (Manuel Polo).
- 19 ej., 16.08.2007, ciudad de Vigo (**Pontevedra**) (César Vidal).
- 16 ej., 14.10.2007, parque urbano de A Guarda (**Pontevedra**) (César Vidal).

MADRID

- 8 ej., 05.06.2007, Villaviciosa de Odón (**Madrid**) (Unai Fuente y Justina Pérez).

PAÍS VASCO

- 1 ej., 28.08.2007, Zarautz (**Gipuzkoa**) (Rafael Saiz Elizondo). Se trata del ejemplar ya presente en diciembre de 2006, que sobrevivió al invierno.



Myiopsitta monachus. Barcelona, enero 2007.
Foto: Jordi Clavell.

Amazona aestiva

amazona frentiazul ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E3 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 7; **Años:** 04, 05, 06; **Máx ind:** 5.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 28.09.2007, P.N. del río Guadalhorce (**Málaga**) (Andy Paterson).

CATALUÑA

- 1 ej., 05.02.2007, entre el río Ridaura y el campamento Sant Josep, Santa Cristina d'Aro (**Girona**) (Jaume Ramot). Foto.

Amazona ochrocephala

amazona real

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E3 / E2 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 5.

CATALUÑA

- 1 ej., 01.05.2007, cerca de Diagonal Mar, **Barcelona** (Xavier Tomàs).

COM. VALENCIANA

- 2 ej., durante todo el año 2007, Jardín Botánico de **València** (Pepe Greño Ruiz), donde pernoctan.
- 1 ej., 12 al 19.02.2007, entorno del Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz (**Alacant**) (Alejandro Izquierdo). Foto.



Amazona amazonica

amazona alinaranja

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 04, 06; Máx ind: 2.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 15.01.2007, Postiguet (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento), recapturado.
- 1 ej., 30.01.2007, San Juan (**Alacant**) (Luis Fidel Sarmiento), recapturado.

Amazona albifrons **nueva**

amazona frentialba ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centroamérica.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 14.02.2007, Santa Faz (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere). Se trata de la primera observación de la especie en España.

MUSOPHAGIDAE

Musophaga violacea

turaco violáceo ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** – / E3 . Originaria del este de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06; Máx ind: 1.

CANARIAS

- 1 ej., 04.03.2007, La Laguna (**Tenerife**) (Juan Luis Rodríguez Luengo). Se trata del ejemplar ya presente en 2006. Observado nuevamente a finales de 06.2007 (José Antonio Sicilia Matos). Fotos.
- 1 ej., 21.06.2007, a 10 Km de La Laguna (**Tenerife**) (Rafa Zamora). Este ejemplar llevaba una anilla.

Crinifer piscator

turaco gris occidental ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCÍA

- 1 ej., 01.12.2007, Coín (**Málaga**) (Paul Howard, comunicado por Harry Abbott y Javier Elgorriaga). Foto.



Crinifer piscator.
Coín, Málaga,
diciembre 2007.
Foto: Paul Howard.

STRIGIDAE

Bubo africanus

búho africano

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** – / E3 . Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CANARIAS

• 1ej., 06.2007, proximidades de Mazacote, Tuineje (**Fuerteventura**). El ejemplar, desnutrido, fue recogido y llevado al Centro de Recuperación de Fauna de Tafira del Cabildo de Gran Canaria. Sin señales aparentes de cautividad (plumaje y patas en buen estado, sin anillas ni pihuelas), se liberó en 07.2007 en la misma localidad, pero al poco tiempo fue nuevamente capturado en las inmediaciones (sugiriendo un posible origen cautivo). A poca distancia existe un núcleo zoológico donde tienen esta especie (aunque allí se niega su procedencia). No se puede descartar la posibilidad de una llegada natural de la especie (información comunicada por Pascual Calabuig y Juan Antonio Lorenzo).

Otras especies utilizadas en cetrería, con escapes registrados (*Strigiformes*):

Tyto alba

lechuza común

(Nativa, **Categoría:** A E3 / A)

Bubo bubo

búho real

(Nativa, **Categoría:** A E3 / –)

Athene noctua

mochuelo europeo

(Nativa, **Categoría:** A / –)

BUCEROTIDAE

Buceros bicornis **nueva**

cálaro bicorne

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de India, sudeste asiático, Indonesia.

COM. VALENCIANA

• 1 ej., 01.12.2007, cruce hacia Rincón de Loix de la carretera N-332, Benidorm (**Alcant**) (José Santamaría). Probablemente el mismo ejemplar visto un mes antes en la zona del Albir (Dani Gilbert). Se trata de las primeras observaciones de esta especie en España.

RAMPHASTIDAE

Ramphastos sulfuratus **nueva**

tucán piquiverde

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centroamérica.

ANDALUCÍA

• 1 ej., 16.04.2007, Estepona (**Málaga**) (Antonio Ternero). Escapado de parque zoológico SELWO. Se trata de la primera observación de la especie en España.

PYCNONOTIDAE

Pycnonotus jocosus

bulbul orfeo

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2** . Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 98, 00, 01, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 15.

COM. VALENCIANA

• Nidificación en La Cañada/ Paterna (**València**) durante 2007 (Francisco Gresa). El 13.01 se observó 1 ej. en La Cañada. El 25.02 se observaron 8 ej. en El Plantío, seis sobre un grupo de palmitos elevados (*Trachycarpus fortunei*) y seguidamente una pareja más. Foto. El 04.03 se observaron 12 ej. en Paterna. Foto. El 03.08 se observa también en Paterna dos adultos alimentando un pollo, que se encuentra muerto el 05.08. En la zona existe una colonia reproductora de la especie desde 2003.



***Pycnonotus jocosus*. Paterna, València, agosto 2007.
Foto: Francisco Gresa.**

Hypsipetes leucocephalus **nueva**

bulbul negro

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / -** . Originaria de India, sudeste asiático.

BALEARS

• 1 ej., 26.04.2007, Cala Sant Vicenç (**Mallorca**) (Jeanette Lindkvist y Ann Mari Thorner, comunicado por José Luis Martínez Martín). Foto. Se trata de la primera observación de la especie en España.



*Hypsipetes
leucocephalus.*
Cala Sant Vicenç,
Mallorca, abril 2007.
Foto: Jeanette
Lindkvist / Ann
Mari Thorner.

TIMALIIDAE

Leiothrix lutea

ruiseñor del Japón ■

Especie exótica establecida. **Categoría: C / E2**. Originaria de China. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 97, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 17.

CATALUÑA

- Hasta 14 ej., 11.02.2006, Parc del Laberint, **Barcelona** (Xavier Batllori). Se observan grupos menores durante los días siguientes y existe una última observación de 6 ej. el 26.03. No se observó ningún ejemplar durante el otoño e invierno siguientes.

MADRID

- 1 ej., escuchado al atardecer, 07.2007, Arroyo Meaques, Casa de Campo, **Madrid** (Raúl Alonso).

CORVIDAE

Cyanopica cyanus

rabilargo

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CATALUÑA

- 1 ej., cadáver reciente, 30.06.1972, afueras de Figueres (**Girona**) (Jordi Sargatal, comunicado por Carlos Álvarez). No es seguro que se tratase de un escape.

Pica pica

urraca

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / –

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

BALEARS

- 1 ej., 25.02.2007, tarayal cercano a la charca de Cas Ferrer Nou, Alcúdia (**Mallorca**) (Biel Perelló).
- 1 ej., 29.09.2007, faro de Ses Salines (**Mallorca**) (Juan José Bazán). Foto.
- 1 ej., 02.12.2007, entre Alaró y Bunyola (**Mallorca**) (comunicado por Pere Vicens).

Corvus albus

cuervo blanco

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 00, 03, 04, 06; Máx ind: 2.

GALICIA

- 1 ej., durante 2007, A Laxe de Rons, O Grove (**Pontevedra**) (Cosme D. Romai). Presente en la zona desde el 04.07.2006. Hubo un intento de cría en 04.2007 con un ejemplar de *Corvus corone*, sin éxito.
- 1 ej., 03.05.2007, Cariño (**A Coruña**). Presente en fechas posteriores hasta fin de año. Aparentemente es un ejemplar diferente del observado en O Grove (Ricardo Hevia; José Miguel Alonso).

STURNIDAE

Gracula religiosa

miná del Himalaya

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de India, sudeste asiático.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 04, 05; Máx ind: 3.

CATALUÑA

- 2 ej., 25.01.2007, casco urbano de El Prat de Llobregat (**Barcelona**) (Ángel Fernández).
- 1 ej., 11.09.2007, R. N. del Delta del Llobregat (**Barcelona**) (Ferran López). Foto.



Gracula religiosa. R.N. del delta del Llobregat, Barcelona, setiembre 2007. Foto: Ferran López.

Acridotheres tristis

miná común ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Originaria de India, sudeste asiático.
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 04, 05, 06; Máx ind: 12.

BALEARS

- Varios ejemplares, principios de 2007, zona de Andratx (**Mallorca**). Tras ser recapturada, la población que existía en la zona ha desaparecido. No hay registros posteriores a 05.2007 en toda la isla (Susana Saavedra).

CANARIAS

- Varios ejemplares, 2007, Santa Cruz de **Tenerife**. La población establecida en la Iglesia de la Concepción ha desaparecido, no habiendo nuevos registros en la zona (Susana Saavedra).
- 2 ej., 21.06.2007, en los alrededores del recinto del Loro Parque, Puerto de la Cruz (**Tenerife**) (Susana Saavedra).
- 3 ej., 06.2007, La Lajita (**Fuerteventura**) (Susana Saavedra).
- 1 ej., 20.08.2007, en la zona de Los Cristianos (**Tenerife**) (Susana Saavedra).

Acridotheres cristatellus

miná crestado ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / - . Originaria de China, sudeste asiático.
Ant. Noticiarios: Citas: - ; Años: - ; Máx ind: - .

CANTABRIA

- 1 ej., 2007, zona residencial ajardinada del paseo de Pérez Galdós, Santander (**Cantabria**) (Esther Abad y Xulio Valeiras). Presente ya desde el 15.11.2004, existiendo desde entonces algunas observaciones intermedias. Continúa todo el año, con una observación el 01.02.2008. Foto.

Gracupica nigricollis

estornino cuellinegro

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Originaria del sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCÍA

- 1 ej., 14.01.2007, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas (**Málaga**) (Juan Ignacio Álvarez y Javier Fregenal). Presente hasta fin de año.
- 1 ej., 25.09.2007, Parador de Golf entre Málaga y Torremolinos (**Málaga**) (Andy Paterson).

Lamprotornis superbus

estornino soberbio

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 06; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 30.06.2007, tramo medio del Guadalhorce (**Málaga**) (Ángel García). Fotos.
- 2 ej., 16.09.2007, urbanización Guadalmar, junto al río Guadalhorce (**Málaga**) (Santiago Villa, Patricia Macauley, Andy Paterson y otros).



Lamprotornis superbus. Río Guadalhorce, Málaga, junio 2007. Foto: Ángel García.

PLOCEIDAE

Ploceus velatus

tejedor vitelino ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 20.04.2007, Alboraiá (**València**) (Rafa Muñoz Bastit).

Ploceus melanocephalus

tejedor de cabeza negra ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / –**. Originaria de África.
 Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 03, 04, 06; Máx ind: 7.

CATALUÑA

- Nidificación durante 2007 en la desembocadura del río Tordera, Malgrat de Mar (**Barcelona**). En 01.2007 se encuentran dos nidos, uno de ellos utilizado y el otro sin terminar, en Pla de Grau. Se observa una hembra el 31.01. Más tarde, se observan en el río Tordera 2 ej. el 29.03 y una hembra al día siguiente. Foto. En 08.2007 se detectan unos 11 nidos en la zona de la desembocadura del río, con presencia de 2-4 machos y un mínimo de 8 hembras (Xavier Romera). El 11.09.2007 se detectan más nidos en la desembocadura, de los que sólo dos estaban ocupados: uno con dos pollos y un huevo no viable, y otro con tres huevos que parecían fríos; por la zona se observan por lo menos 3 machos y 5-6 hembras (Xavier Romera y Joan Carles Fernández-Ordóñez).

GALICIA

- 1 ej., macho, 10.05.2005, laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**). El ejemplar, que es controlado, fue anillado en 2004 en Ponteceso, a más de 70 Km al norte. Permanece durante todo el verano en la laguna de Vixán, donde es observado frecuentemente con reclamo territorial sobre el carrizo (Manuel Polo).
- 1 ej., macho, 04.2007, laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**). Capturado durante sesión de anillamiento. Asociado a una hembra de *Euplectes afer* (Manuel Polo).

Quelea quelea

quelea común ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3**. Originaria de África.
 Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 05; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 11.09.2007, Pla de Grau, Malgrat de Mar (**Barcelona**) (Joan Carles Fernández-Ordóñez, Xavier Romera y Ángel Fernández). Fotos. El 29.09 se observa otra vez un macho en la misma zona, en la desembocadura del río Tordera, posiblemente junto a una hembra (José Moreno).

Euplectes afer

tejedor amarillo ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3**. Originaria de África.
 Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 60.

ANDALUCÍA

- Varios centenares de ej., 27.09.2007, arrozal de Isla Menor (**Sevilla**). Algunos machos aún en plumaje nupcial. Se movían al unísono, en bandos bulliciosos, junto a gran cantidad de

estríldidos y algún *Ploceus* sp. (probablemente *P. melanocephalus*) (Manolo Romero, Fernando del Valle, Mario Martín y Paco Chiclana).

CATALUÑA

- 3 ej., un macho y dos juveniles, 3 y 23.07.2007, arrozales y Rec Sirvent de Riumors (**Girona**) (Álex Ollé, Albert Burgas y Jordi Martí Aledo). El macho presentaba comportamiento territorial. Foto. Más tarde, el 02.08 se observa una pareja con 2-3 juveniles (Álex Ollé y Jordi Martí Aledo).
- 1 ej., macho, 25.09.2007, Golf Serres de Pals, Pals (**Girona**) (J. Oliveres).
- 1 ej., 19.10.2007, cal Bitxot, el Prat de Llobregat (**Barcelona**) (Armand Ramal).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho adulto, 18.09.2004, Peníscola (**Castelló**) (Juan Antonio Muyas Bercet). Capturado durante sesión de anillamiento.
- 1 ej., macho, 19.09.2004, P. N. de la Marjal de Pego-Oliva (**Alacant**) (Juan Salvador Monrós y Rubén Piculo Mateo), es anillado.
- 1 ej., macho, 23.09.2007, Tancat de La Ratlla, Silla, l'Albufera de **València** (comunicado por Toni Polo)

GALICIA

- 2 ej., macho y hembra, 07.2006, laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**) (Manuel Polo). Capturados durante sesión de anillamiento.
- 1 ej., hembra, 04.2007, laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**) (Manuel Polo). Capturado durante sesión de anillamiento.
- 1 ej., hembra, del 28.11 al 05.12.2007, cercanías de la laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**) (Manuel Polo). No tiene anilla.

MADRID

- 1 ej., hembra, 29.09.2007, carrizal de Los Albardales, San Martín de la Vega (**Madrid**) (R. Moreno-Opo y otros). Capturado durante sesión de anillamiento. Foto.

Euplectes hordaceus

tejedor de corona roja ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

GALICIA

- 1 ej., macho, 18.10.2007, cabo Silleiro, Baiona (**Pontevedra**) (César Vidal).



***Euplectes hordaceus*.**
Baiona, Pontevedra,
octubre 2007.
Foto: César Vidal.

Euplectes orix

tejedor rojo

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 9; Años: 02, 04, 05, 06; **Máx ind:** 2.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 04.10.2006, Torre d'en Dolça, Vila-seca de Solcina (**Tarragona**) (Joan Ferré).

GALICIA

- 2 ej., macho y hembra, años 2005 y 2006, carrizales del río Ulla, Dodro (**A Coruña**). Se reproducen durante ese tiempo en la zona de carrizal y bosque denso de ribera (Manuel Polo).
- 2 ej., macho y hembra, 07.2006, laguna de Vixán, P.N. Corrubedo (**A Coruña**) (Manuel Polo). Capturados durante sesión de anillamiento.

ESTRILDIDAE

Amandava amandava

bengalí rojo

Especie exótica establecida. **Categoría: C / E2**. Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 7; Años: 03, 04, 06; **Máx ind:** indet.

CASTILLA-LA MANCHA

- Nidificación durante 2007 en Carpio de Tajo (**Toledo**) (M. Pilar Lanzarot Freudenthal). Población reproductora abundante, con al menos unas 20 crías. Fotos.
- 4 ej., 18.11.2007, emblase de Cazalegas, río Alberche (**Toledo**) (Carlos Martín). Fotos.

EXTREMADURA

- Millares de ejemplares durante 2007 en Coria (**Cáceres**), en zona de regadíos (comunicado por Javier Prieta).

Estrilda melpoda

estrilda de carita naranja

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 05; **Máx ind:** 5.

ANDALUCÍA

- 4 ej., 13.07.2007, Parque de Miraflores, **Sevilla** (Fernando Zamora). Foto.

COM. VALENCIANA

- Hasta 40 ej., durante 2007, partida Patos, Marjaleria, **Castelló** (Xavier Barreda): 2 ej. el 09.01, 40 ej. el 29.01, 10 ej. el 13.02, 2 ej. el 26.06, 10 ej. el 27.11, 2 ej. el 04.12, 15 ej. el 11.12 y 3 ej. el 30.12.
- 5 ej., 21.04.2007, río Turia, junto a Benaguasil (**València**) (Toni Polo Aparisi y María De Juan Sanchis). Al día siguiente se observaron 2 ej. en el mismo río, junto a Vilamarxant (Toni Polo Aparisi).



Estrilda melpoda. Sevilla, julio 2007.
Foto: Fernando Zamora.

Estrilda troglodytes

estrilda culinegra

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / E2 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 04, 05, 06; Máx ind: 4.

CATALUÑA

- 1 ej., del 17.04 al 01.10.2006, parc del Guinardó, **Barcelona** (Xavier Batllori).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., adulto, 18.09.2004, Peñíscola (**Castelló**) (Juan Antonio Muyas Bercet). Capturado durante sesión de anillamiento.

MADRID

- 1 ej., 23.07.2007, Arroyo de la Vega, Nuevo Baztán (**Madrid**) (Q. Marcelo). Foto.

Estrilda astrild

pico de coral

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / C . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 94, 02, 03, 04, 05, 06; Máx ind: 60.

ANDALUCÍA

- 5-6 ej., 16.03.2007, río Guadalquivir, **Córdoba** (Javier de la Cruz y Eva Rojas).

BALEARS

- Alrededor de 40 ej., durante 2007, P. N. de s'Albufera (**Mallorca**) (Pere Vicens).

CATALUÑA

- Nidificación en 05.2005 en la ciudad de **Barcelona**. Observada una pareja alimentando pollos en la calle Berlínés (entre S. Mario y Arimón) (Concepció Nadal y Jacint Nadal Puigdefábregas; comunicado por Xavier Ferrer).
- 9 ej., 20.07.2006, el Clot, Poblenou del Delta (**Tarragona**) (Joan Ferré y Ricardo Rodríguez).
- Hasta 300 ej., durante 2007, en la desembocadura del río Tordera y alrededores (**Barcelona/Girona**). Concentraciones superiores a los 100 ej. en algunas fechas, y de hasta 250-300 ej. en la Bassa de Formasa el 17.12.2007 (Xavier Romera; Joan Carles Fernández-Ordóñez y Ignasi Toranzo; David Caballé; Enric Badosa y Freddy Ribas; Antonio España).
- 7 ej., 05.03.2007, Can Torrent, Tordera (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez, Ignacio Toranzo y Xavier Romera). Foto.
- 10-12 ej., 23.03.2007, río Besòs, la Llagosta (**Barcelona**) (Valentí Costafreda).
- 8 ej., 05.05.2007, riera de Caldes, Palau-solità i Plegamans (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez, Ángel Fernández, Ignacio Toranzo y Xavier Moreno). Foto. Otra vez 8 ej. el 12.05 (Antonio España, Ignacio Toranzo y Xavier Moreno).
- 4 ej., 16.05.2007, Molí d'en Puigverd, Palafolls (**Barcelona**) (Xavier Romera). Foto.
- 2 ej., 07.06.2007, aiguamolls de Molins de Rei (**Barcelona**) (Carles Furquet).
- 4 ej., 17.06.2007, Calella (**Barcelona**) (Pau de la Torre).
- 2 ej., construyendo nido, 30.08.2007, Can Salze, Lliçà d'Amunt (**Barcelona**) (Ángel Fernández).
- Más de 100 ej., 01.09.2007, río Mogent, Vilanova del Vallès (**Barcelona**) (J.C. Fernández-Ordóñez, Ángel Fernández e Ignacio Toranzo).
- 3 ej., 13.10.2007, estany de Sils, Sils (**Girona**) (Hubert Mas). Foto.
- Alrededor de 15 ej., 07.12.2007, río Tenes, Santa Eulàlia de Ronçana (**Barcelona**) (Vittorio Pedrocchi). Se observan otros 10 ej. el día 26.12.

COM. VALENCIANA

- Hasta 60 ej., durante 2004, Marjal d'Almenara (**Castelló**): 14 ej. el 03.01, 1 ej. el 31.05 (Fernando Ramia); 40 ej. el 24.12 (David Olmos); 60 ej. el 31.12 (Fernando Ramia).
- 2 ej., 08.09.2004, Betxí (**Castelló**) (Josep Bort Cubero).

EXTREMADURA

- Bando de número indeterminado, 05.2006, Coria (**Cáceres**) (comunicado por Javier Prieta).

GALICIA

- 2 ej., 09.10.2005, depuradora del río Sar, Bertamirans, Santiago de Compostela (**A Coruña**) (Manuel Polo). Presentes en un hábitat de *Salix* sp. y maizales.
- Nidificación entre los años 2005 y 2007 en el norte de la Ría de Arousa (**A Coruña**), con una población próxima al millar de ejemplares. Esta especie parece haberse expandido desde el norte de Portugal, llegando recientemente, a partir de la década de 1990, al norte de la ría de Arousa (términos municipales de Rianxo, Boiro, Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Ribeira). La especie ocupa principalmente áreas de matorral, zonas palustres y cultivos del litoral, siendo rara hacia el interior (información recopilada y elaborada por Manuel Polo).
 - *Rianxo*: Población estimada de unos 200 ej., repartidos en varios núcleos junto al litoral.
 - *Boiro*: Población mínima de 50 ej., repartidos en dos núcleos, ocupando un hábitat de matorral degradado junto a huertas y prados.
 - *Pobra do Caramiñal*: Alrededor de 50 ej., en dos núcleos, ocupando carrizales litorales.
 - *Porto do Son*: Población estimada de unos 80 ej. en 2005 y un mínimo de 200 ej. en 2007, ubicada en las lagunas de San Pedro de Muro y Xuño. Existen otros núcleos de cría en Baroña y otras aldeas litorales.
 - *Ribeira*: Población estimada de unos 100 ej. en 2005 en el P. N. de Corrubedo. En 2006 la colonia de cría desaparece del Parque como consecuencia de un incendio que quema el carrizal donde se ubicaba, trasladándose la población a las proximidades. En 2007 la especie vuelve a colonizar el Parque, presentando un mínimo de 200 ej. repartidos en dos núcleos: la laguna de Vixán (unos 150 ej.) y la marisma de Carregal. Además, existen unos 50 ej. en otros pequeños núcleos del término municipal, ocupando zonas de prados y cultivos. La población del Parque utiliza preferentemente carrizales, así como prados, setos y herbazales. Sin embargo, en 2006 se localizó una pareja nidificando en el interior de un eucaliptal. Entre 11.2004 y 12.2007 se capturaron para anillamiento 71 ej. en el carrizal de la laguna de Vixán. El 90% eran juveniles en su primer año de vida. No se efectuó ninguna recuperación. En 08.2006 se capturó una hembra con placa incubatriz y en 08.2007 otra con huevo en el

conducto cloacal. Se capturaron pollos volantones recién emplumados en el mes de septiembre. Así, la mayor parte de la población nidificaría de forma gregaria entre agosto y octubre.

○ Existe un núcleo importante de la especie en el río Ulla a su paso por Dodro, donde en 2005 y 2006 se estimó una población de aproximadamente 500 ej., ubicada en un denso carrizal y en prados cercanos a la desembocadura en la Ría de Arousa.

● Más de 100 ej., durante 2007, Valle Miñor (**Pontevedra**). La población del valle (municipios de Baiona, Gondomar y Nigrán) aumenta sin cesar, observándose bandos de más de 100 individuos en diferentes zonas (César Vidal).

● 1 ej., macho, durante 2007, Jardines de Mendez Nuñez y Parque de Santa Margarita, ciudad de **A Coruña** (Amadeo A. Pombo Eirín y Mariana Roura Sánchez).



Estrilda astrild. R.N. del delta del Llobregat, Barcelona, enero 2007. Foto: Ferran López.

Taeniopygia guttata

diamante mandarín

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3. Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 05, 06; Máx ind: 10.

COM. VALENCIANA

● 3 ej., 29.12.07, Quartella, Godella (**València**) (Arturo Cabos).

Erythrura trichroa **nueva**

diamante tricolor ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia, Pacífico.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 07.09.2006, La Vila Joiosa (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere). Se trata de la primera observación de la especie en España.



Lonchura striata

capuchino de lomo blanco ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de India, sudeste asiático.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CANARIAS

- 1 ej., 08.05.2007, Centro de Visitantes de la Cruz del Carmen, Las Mercedes (**Tenerife**) (Carmen García de la Cruz), capturado. Foto.

Padda oryzivora

gorrión javanés ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Indonesia.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., joven, 20.03.2007, La Marina (**Alacant**) (Ken Howes, comunicado por Luis Fidel Sarmiento). Foto.

VIDUIDAE

Vidua macroura

viuda colicinta

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**
Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., macho, 21.10.2007, Manises (**València**) (Marco Matilla Calle), en una zona de árboles frutales.

FRINGILLIDAE

Serinus canaria *var. domestica*

canario doméstico

Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / –** . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 05, 06; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., color verde, 15.11.2007, plaza El-Íptica, Tàrraga (**Lleida**) (Josep Escolà).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 14.11.2006, Alcoi (**Alacant**) (Marcos Ferrández Sempere).

Serinus mozambicus

canario de Mozambique

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3** . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 05, 06; Máx ind: 3.

ASTURIAS

- 1 ej., macho, 18.10.2007, Peroño, Luanco, Gozón (**Asturias**) (Manuel Fernández Pajuelo).