


NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS 2008

Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

Recopilación y edición: Marcelino Martín, David M. Santos,
Jordi Clavell, Joan Carles Fernández-Ordóñez, Antonio Polo.

Junio 2010



Grupo de Aves Exóticas - SEO/BirdLife

www.seo.org/?grupodeavesexoticas

exoticas@seo.org

Noticario de aves exóticas

Este documento es una recopilación de citas de aves exóticas observadas en libertad en nuestro país durante el año de 2008. También se incluyen algunas citas pertenecientes a años anteriores y sólo conocidas con posterioridad, señaladas con una entrada en color azul.

Además de las especies exóticas, este documento incluye también las citas de cualquier ejemplar, variedad o especie que haya sido introducido por el hombre. Así, se incluyen también:

– *Especies nativas*. En ocasiones son introducidos en nuestro país ejemplares de especies autóctonas, es decir, de especies que se encuentran ya de forma natural en nuestro territorio. Su inclusión en el presente documento se justifica por desconocerse, en la mayoría de los casos, su auténtica identidad genética o taxonómica. A menudo los ejemplares introducidos pertenecen en realidad a subespecies o variedades diferentes de las nativas. Y en ocasiones incluso pueden presentar algún grado de hibridación con otras especies.

– *Variedades domésticas*. Con frecuencia son introducidos en nuestro país ejemplares de variedades que son resultado de la modificación, por selección artificial, de especies nativas o exóticas. En muchos casos se considera que la selección artificial ha modificado lo suficiente estos ejemplares como para tratarlos como variedades propias, diferentes de las silvestres. Así, todas las variedades domésticas, por no ocurrir naturalmente en el medio natural, se consideran aquí equivalentes a variedades o especies exóticas.

– *Híbridos*. En ocasiones son introducidos ejemplares resultado de la hibridación entre especies nativas y exóticas, o entre especies silvestres y variedades domésticas. Cualquier grado de hibridación entre estos grupos justifica que los ejemplares sean tratados como elementos extraños a nuestra fauna.

El presente Noticario señala la introducción en nuestro país de cerca de **80 especies** durante el año de 2008, siendo la gran mayoría especies exóticas. Por tanto, existe escasa diferencia en relación a los números de años anteriores, donde el número de especies introducidas rondó el centenar. Estas elevadas cifras revelan el grave impacto a que regularmente son sometidos nuestros ecosistemas autóctonos. Y revela también la imperiosa necesidad que existe de acabar de una vez por todas con esta situación, evitando la aparición de nuevas especies exóticas invasoras en nuestro país.

El presente documento, que recopila las citas del año 2008, no muestra la totalidad de las especies que han sido introducidas a lo largo de los años en nuestro país. La lista completa de las especies introducidas en España (categorías C y E) puede consultarse en la página del GAE: <http://www.seo.org/?grupodeavesexoticas>

Listado de especies

Las especies se presentan agrupadas por familias, que son ordenadas siguiendo el orden taxonómico habitual e incorporando las modificaciones más recientes. Dentro de cada familia, también es utilizado el mismo orden habitual para listar las especies. Para cada especie existe un encabezamiento, un pequeño texto introductorio y un listado de las citas registradas.

Encabezamiento

En el encabezamiento de cada especie consta el **nombre científico**, el **nombre vulgar** (se siguen las recomendaciones de SEO, con algunas adaptaciones) y, por último, un símbolo que señala el grado de establecimiento (*categoría*) de la especie en nuestro país:

- Especie ocasional (*E3*): especie de la que se conocen únicamente en libertad ejemplares solitarios o pequeños grupos no reproductores.
- Especie reproductora (*E2*): especie de la que existen registros de reproducción en libertad, aunque sin formar nunca poblaciones reproductoras.
- Especie próxima a establecerse (*E1*): especie que presenta poblaciones reproductoras recientes o de carácter irregular, no estando asegurada su viabilidad.
- Especie establecida (*C*): especie que presenta poblaciones reproductoras regulares y estables que aseguran la viabilidad de la especie y su posible crecimiento y expansión.

Además, cuando las citas suponen la primera observación de la especie en nuestro país, o el primer registro en nuestros Noticiarios, se añade la indicación: **nueva**.

Texto introductorio

Para cada especie se señala la situación en que se encuentra en nuestro país, la categoría que se le asigna, la zona geográfica de que es originaria y las causas principales de su introducción en nuestro territorio.

La **categoría** es aquí señalada por separado para la Península (incluyendo las islas Baleares) y para las Canarias, las dos principales zonas zoogeográficas existentes en nuestro país, indicándose con el siguiente orden:

Categoría: (*Península y Baleares*) / (*Canarias*).

También se incluye para cada especie información recogida en anteriores Noticiarios de Aves Exóticas (2003-2007), señalándose los siguientes datos:

- **Citas:** Indica el número total de registros (entradas) recogidos en los anteriores Noticiarios. Cuando dicho valor es superior a diez, se señala con una cruz (+).
- **Años:** Se indican todos los años en que existen citas. En caso de haber años consecutivos, se indica el primero y el último con un guión (por ejemplo: 03, 05-07 se refiere a 2003, 2005, 2006 y 2007).
- **Máx ind:** Se indica el número máximo de individuos registrados en una sola observación.



Ibis sagrado (*Threskiornis aethiopicus*). El Ejido, Almería, julio 2008.
Foto: Francisco Javier Molina Jiménez

Citas de especies

Las citas han sido agrupadas por Comunidades Autónomas. Dentro de cada una de ellas, las citas se encuentran ordenadas cronológicamente.

A menudo han sido agrupadas en una única entrada todas las citas que corresponden aparentemente al mismo ejemplar o al mismo grupo de ejemplares, o que describen la misma situación. En este caso se suelen excluir las citas que, dentro del conjunto, resultan más repetitivas.

También se excluyen las citas que, por su carácter, resultan claramente redundantes. Así, cuando se considera que una especie está establecida desde hace tiempo en la zona en que ha sido observada, las citas son normalmente excluidas. Aunque también puede ser incluida cuando presenta un particular interés, o ser resumida junto con otras. Así, para conocer la situación de una determinada especie en nuestro país, se recomienda consultar toda la información adicional presente en la página del GAE.

Agradecimientos

El presente documento es una recopilación de las citas de aves exóticas publicadas, divulgadas o transmitidas directamente al Grupo de Aves Exóticas durante el año de 2008. Queremos por tanto agradecer a todas las personas que, de una forma o de otra, han contribuido a la elaboración de este Noticiero, así como felicitarles por su decidido interés en documentar la presencia de las aves exóticas en nuestro país.

Cita recomendada para el documento:

GRUPO DE AVES EXÓTICAS (SEO/BirdLife) (Coord.: Martín, M., Santos, D.M., Clavell, J., Fernández-Ordóñez, J.C., Polo, A.). 2010. *Noticiero de aves exóticas 2008*. www.seo.org/?grupodeavesexoticas

NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

suiriri bicolor

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), con reproducción registrada. **Categoría: D E2 / -**. Originaria de América, África, India.

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 91, 03-07; Máx ind: 3.

CANARIAS

• 6 ej. adultos, más 8 pollos, 10.07.2008, campos de golf de San Miguel, **Tenerife** (J. A. Lorenzo). Los ocho pollos, que pertenecen a una única pareja, continúan el 15.07 (J.A. Lorenzo, R. Gutiérrez). Los otros adultos suelen pasar el día en las charcas del complejo del campo de golf, aunque en ocasiones vuelan al exterior e incluso han sido vistos en otras charcas de riego cercanas, como por ejemplo el 06.09

(Beatriz Fariña). En el mismo lugar existen ya citas en años anteriores: 9 ej. el 12.02.2006 (Alan Miller), junto a algunos *D. viduata*, y los mismos el 14.08.2006 (Chris Tynan). Criaron también con éxito en 2007 (Beatriz Fariña, J.A. Lorenzo). El ejemplar visto el 19.08.2005 en la bahía de El Médano, Granadilla de Abona podría pertenecer a este grupo (Enrique Arnaiz, com. por J.A. Lorenzo).

Cygnus olor

cisne vulgar

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / E3**. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04-07; Máx ind: +20.

CANARIAS

• 1 ej., macho adulto, 02.2008 y en adelante, San Lorenzo, Las Palmas de **Gran Canaria** (Ángel Cruz Moreno), en una balsa de riego. Fotos.

EXTREMADURA

• 3 ej., 12.09.2006, Embalse de Alcántara (**Cáceres**) (Carlos Fernández). Otro ej. el 15.08 en Serrejón (Emilio "Alcaudón" y Manuel García del Rey, com. por J. Prieta y S. Mayordomo).

COM. VALENCIANA

• 2 ej., 12.02.2008, Barranc de les Ovelles (**Alicante**), en imágenes ofrecidas por el Canal 9 RTVV (com. por Toni Polo Aparisi).

Cygnus atratus

cisne negro

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / –. Originaria de Australia, Nueva Zelanda. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-07; Máx ind: 3.

CATALUÑA

- 2 ej., del 24.01 al 14.02.2008, río Llobregat, Molins de Rei (**Barcelona**). Posteriormente 3 ej. el 23.03 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: SSAA).
- 1 ej., 08.02.2008, Salats i Muntanyans, Torredembarra (**Tarragona**), y con posterioridad el 02.03 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PABA, XBGA).
- 2 ej., 08.03.2008, Maresma de Filipines, Delta del Llobregat (**Barcelona**), y con posterioridad 3 ej. vistos el 05.04, 12.04 y 07.06 (Antonio Rodríguez Sinovas). Existen otras citas desde el 09.02 hasta el 29.09 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO).
- 1 ej., 07.04.2008, desembocadura del Foix, Cubelles (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: VPRA).

EXTREMADURA

- 2 ej., 06.11.2004, Moheda Alta, Navalvillar de Pela (**Badajoz**) (Vicente Risco). Otro ej. el 25.05 volando sobre el río Jerte en Plasencia (**Cáceres**) (Carmen S. Espejo) (com. por J. Prieta y S. Mayordomo).

PAIS VASCO

- 3 ej., 09.11.2008, ría de Gernika, Busturia (**Vizcaya**), frente al observatorio de aves que hay en esta localidad en la margen izquierda de la ría, en el Urdaibai (Iván Sarabia). Quizás provenientes de la ría de Deva, en Guipúzcoa.
- 1 ej., durante la primera mitad de 2008, laguna de Laguardia (**Álava**) (Sergio de Juan). Posiblemente escapado de un zoo próximo.

Anser anser var. domestica

ánsar doméstico

Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / –. Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.
Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 02, 06, 07; Máx ind: 8.

EXTREMADURA

- 2 ej., 2008, Embalse del Jerte, Casas del Castañar (**Cáceres**). Presentes desde

12.05.2006. Se mantienen aún en 05.2009 (Javier Prieta).

Anser indicus

ánsar indio

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / –. Originaria del centro de Asia.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 01, 05, 06; Máx ind: 2.

CASTILLA Y LEÓN

- 1 ej., 20.11.2008, laguna de La Nava (**Palencia**), junto a ánsares comunes (Fernando Valenciano, com. por Mario Alonso).

CATALUÑA

- 2 ej., 2008, parc de Corbins (**Lleida**) (Jordi Calvet).

Branta canadensis

barnacla canadiense ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente).

Categoría: C*/- . Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 8; Años: 03-07; Máx ind: 2.

CATALUÑA

● 1 ej., 25.10.2008, Isla de Buda, Delta del Ebro (**Tarragona**), presente hasta el 29.12 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: CJMA, ISSB, JFOD, AFFC, MZZA, ACTA, DBCA, RBVA, SSXA).

PAIS VASCO

● 1 ej., 22.11.2008, desembocadura del río Nervión, Santurtzi (**Vizcaya**) (Gorka Ocio).

Alopochen aegyptiaca

ganso del Nilo ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / - . Originaria de África. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 01, 03-07; Máx ind: 10.

ARAGÓN

● 1 ej., 29.08.2008, ciudad de **Zaragoza**, visto bajo el puente de Hierro. También observado entre el 27 y el 31.12 (Pedro Bescós).

Roda, Les Masies de Voltregà, Gallifa, Espadamala, etc, y también en Santa Maria de Corcó.

● 2 ej., 23.11.2008, Salou (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 – ICO: JAIA).

ASTURIAS

● 2 ej., 24.11.2008, puerto de El Musel, Gijón (**Asturias**), en los diques de La Osa. Uno de ellos insistentemente acosado por una gaviota patiamarilla. Observados durante 4 días, coincidiendo con una entrada de ánsares. Sin embargo, en el Parque de Isabel la Católica de la ciudad existe una colección de estos gansos, y algunos de ellos vuelan sin problemas (Ignacio Vega).

COM. VALENCIANA

● 2 ej., finales 09.2008, Parc de Capçalera (**Valencia**) (Fco. Javier García y Gans).
● 1 ej., finales 09.2008, Sueca (**Valencia**) (Fco. Javier García y Gans).
● 1 ej., 03.10.2008, marjal de Pego-Oliva (**Valencia**) (Fco. Javier García y Gans).
● 2 ej., 12.10.2008, Barranc del Carraixet-Alboraya (**Valencia**), ambos presentan anilla en tarso derecho. (Raúl Vera). Foto.

CANTABRIA

● 1 ej., 26.09.2008, pantano del Ebro (**Cantabria**) (Manu, com. por Máximo Sánchez Cobo). También el 01.10 (Manu Estébanez, Justina Pérez, Unai Fuente, Ana Narciso, Antonio Ceballos).

EXTREMADURA

● 1 ej., 22.04.2007, Dehesa Boyal de Navalmoral de la Mata (**Cáceres**), en una charca (P. Gómez).
● 8 ej., una pareja con 6 pollos, 2007, Embalse de Ibahernando (**Cáceres**) (J. Panadero).
● 1 ej., 25.08.2007, Charca del Ancho, Arroyo de la Luz (**Cáceres**) (Florencio Carrero y Rafael Parra). Permanecen hasta el 27.10 (Juan Manuel Brías).
● 5 ej., 25.09.2007, Charca de Morante, La Roca de la Sierra (**Badajoz**) (J. Hernández).
● 5 ej., 16.07.2008, Casas de Hito, Madrigalejo (**Cáceres**). Continúan el 12.08 y 4 ej. el 29.08 (Martin Kelsey).
● 7 ej., 20.09.2008, Embalse del Prado, Benquerencia (**Badajoz**) (A. Maestre y L. Díez).
● 2 ej., 18.10.2008, Embalse de Valdesalor (**Cáceres**) (A. Maestre, C. Fernández y Tramuntana Birding Team).

CATALUÑA

● 2 ej., 13.01.2008, Lago de Banyoles (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: CFQA, JBVB, JSXJ, MCLA, PCSA).
● 2 ej., 26.02.2008, La Vall de Bianya (**Girona**), en unos campos inundados (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PLSA).
● 4 ej., 23.06.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en Cal Tet (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: FLSA, DRXD, MFXC).
● 4 ej., 10.10.2008, río Ter, Manlleu (**Barcelona**), también el 25.12 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: JPRB, JGXX, GRXB). Hay otras observaciones a lo largo del año en el río Ter, en Les Masies de

• 8 ej., 18.10.2008, Embalse de los Canchales, La Garrovilla (**Badajoz**) (Tramuntana Birding Team). Con

posterioridad, 3 ej. el 02.11 (J. Gómez Aparicio).



***Alopochen aegyptiaca*. Alboraya, Valencia, octubre 2008.
Foto: Raúl Vera.**

Tadorna ferruginea

tarro canelo

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / A E2**. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 02-07; **Máx ind:** 9.

ANDALUCÍA

• 2 ej., 22.07.2008, marisma de Cetinas, Puerto Real (**Cádiz**), sin anillas o marcas y carácter desconfiado (Rafael García). Con fuertes vientos de levante los días previos, podría no tratarse de un escape (Cat. D).

CANTABRIA

• 3 ej., 25.09.2008, pantano del Ebro, en Requejo (**Cantabria**) (Manu, Javier Portillo, com. por Máximo Sánchez Cobo).

EXTREMADURA

• 1 ej., 06.03.2004, charca de Fresnedillas, Oliva de Plasencia (**Cáceres**) (Mario Arcas).

• 3 ej., posiblemente jóvenes, 04.09.2004, charca de la estación vieja de Arroyo de la Luz (**Cáceres**) (Carlos Fernández y Marcelino Cardalliguet). Fotos.

• 3 ej., 29.06.2005, Charca del Ancho, Arroyo de la Luz (**Cáceres**) (Carlos Fernández). Visto también 1 ej. el 07.08 (Juan Manuel Brías) y 2 ej. el 11.09 (Carlos Fernández).

• Varios ej., finales de 11.2005, Sierra Brava, Zorita (**Cáceres**) (Jesús Porras).

• 1 ej., 01.2006, Casas de Hitos, Madrigalejo (**Cáceres**) (F. García Calle). También 2 ej. el 26.09 (John Muddeman).

• 3 ej., 07.01.2006, Embalse de Sierra Brava (**Cáceres**) (G. Martín García, J. Ruiz, M. Roder y O. Llana). También 2 ej. el 05.11 (Martin Kelsey) y 6 ej. el 19.11 (Limosa Tours y John Muddeman).

• 2 ej., 13.04.2006, Oliva de Plasencia (**Cáceres**) (J. M. Pañero). Continúan el 14.04 (C. Vega y J. A. Montero).

- 1 ej., 20.08.2006, Charca del Ancho (**Cáceres**) (Florencio Carrero y Rafael Parra).
- 8 ej., 07.12.2006, Llanos de Brozas (**Cáceres**), en un encharcamiento natural (Agustín Mogena y Juan Carlos Núñez).
- 1 ej., 18.02.2007, Charca del Ancho (**Cáceres**) (Carlos Fernández).
- 2 ej., 01.04.2007, Embalse de Jarilla (**Cáceres**) (Javier Briz). Posiblemente los mismos 2 ej. que fueron vistos en la Charca de Fresnedillas, Oliva de Plasencia (Sergio Mayordomo).
- 1 ej., hembra, 07.07.2007, Laguna de Galisteo (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo). Se observa también el 09.07, 13.08 y 19.08 (Sergio Mayordomo, Javier Prieta).
- 1 ej., 07.09.2007, Embalse de Talaván (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo).

- 1 ej., hembra, 23.04.2008, Laguna de Galisteo (**Cáceres**). Continúa el 01.05 (Sergio Mayordomo).

MADRID

- 3 ej., 21.04.2008, castillo de Villafranca del Castillo (**Madrid**) (Antonio Gabriel, Luis C. Ortiz, Raúl Urquiaga).
- 2 ej., 29.10.2008, parque Polvoranca de **Madrid** (José Ángel Rodríguez).

NAVARRA

- 2 ej., pareja, 30.07.2008, Laguna de Pitillas (**Navarra**), nadando con un grupo de otras anátidas (Serafín Alarcón, Conchi Mateos). Posteriormente, 1 ej., el 12.09, con un grupo de ánades frisos (Jesús Solana Ramos), siendo frecuente ver este ejemplar en la laguna.

Tadorna cana **nueva**

tarro sudafricano

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudáfrica.
Ant. Noticiarios: Citas: –; **Años:** –; **Máx ind:** –.

EXTREMADURA

- 1 ej., hembra, 16.04.2008, Embalse de los Molinos, Hornachos (**Badajoz**).

Continúa el 06.05 (Juan G. Navedo y Jorge S. Gutiérrez).

Cairina moschata

pato criollo

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Originaria de Centro y Sudamérica.
 Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 03-07; **Máx ind:** 36.

BALEARS

- 1 ej., 18.06.2008, Estany des Peix (**Formentera**) (Barbara Klahr). Foto.
- Varios ejemplares, 26.10.2008, Santa Eulàlia (**Eivissa**) (Stephen Dunstan). Vistos en la desembocadura de un río, junto a otros patos híbridos.

- 4 ej., 27.04.2008, Areny del Molí, Olesa de Montserrat (**Barcelona**) (Anuari Ornitológico. Cat. 2008 - ICO: RAGA, JBXP).

MURCIA

- 7 ej., 01.05.2008, Río Segura, **Murcia**. Los ejemplares son todos de color negro. Siguen presentes 5 ej. el 04.06 (Vicente Giménez).

CATALUÑA

- 1 ej., 12.01.2008, río Onyar, **Girona** (Anuari Ornitológico. Cat. 2008 - ICO: PFLB).



Cairina moschata.
Estany des Peix,
Formentera,
junio 2008.
Barbara Klahr.

Callonetta leucophrys

pato acollarado ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 02, 05-08; Máx ind: 5.

BALEARS

• 2 ej., macho y hembra, 28.10.2008, Parc Natural de s'Albufera (**Mallorca**). La especie ya había sido vista unos meses antes (Pere Vicens).

MURCIA

• 1 ej., hembra, 25.02.2008, lagunas de Campotejar, Molina de Segura (**Murcia**). Observada también los días 27.02, 28.02 y 01.03. Vuela sin problemas (Fernando Escribano, Simón Asenjo, Miguel Ángel López y Ana Cristina Miñano). Fotos.

Aix sponsa

pato joyuyo ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), con reproducción registrada. **Categoría:** D E2 / E3 . Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.
Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03-07; Máx ind: 1.

CANARIAS

• 1 ej., hembra, 19.08.2008, San Miguel, **Tenerife**. Encontrada en un jardín de una casa de La Aldea, fue recogida ese día por el personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Tahonilla del Cabildo Insular de Tenerife. Posteriormente se anilló y liberó. No mostraba señales de procedencia de cautividad, manteniendo además una actitud siempre esquiva ante los observadores, por lo que no se descarta un posible origen natural (comunicado por J.A. Lorenzo).

CASTILLA-LA MANCHA

• 4 ej., dos parejas, 29.01.2009, río Tajo a su paso por **Toledo**, a la altura de la universidad (Manuel Nieto Díaz).

CATALUÑA

• 2 ej., pareja, 10.12.2008, Estany de Graugés, Berga (Barcelona) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: MBVA).

EXTREMADURA

• 2 ej., 10.04.2005, Belvís de Monroy (**Cáceres**), junto a ocas y ánades domésticos, en una finca abandonada (Javier Briz).

- 1 ej., macho, 01.06.2007, Villar de Plasencia (**Cáceres**) (Ricardo Montero).

MADRID

- 1 ej., hembra, 21.12.2008, río Tajo a su paso por Aranjuez (**Madrid**). Integrada en un grupo numeroso de ánades reales así

como ocas y patos domésticos, ocupando una zona del río por debajo de un salto de agua, fotos. En 11.2008 había también una pareja en el Parque de Polvoranca, Leganes (Antonio Honorato Álvarez, Roberto Moreno González).



Aix sponsa.
Aranjuez, Madrid,
diciembre 2008.
Foto: Roberto
Moreno.

Aix galericulata

pato mandarín ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría:** C* E2 / E3 . Originaria del este de Asia. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-07; Máx ind: 10.

ANDALUCÍA

- 1 ej., macho, 10.12.2008, cauce del río Jándula, Andújar (**Jaén**), cerca del pantano del Encinarejo. El ave se juntó y huyó con un grupo de ánades azulones. Sin marcas ni anillas (Antonio Pérez, Blas López).
- 2 ej., 29.12.2008, Benalmádena (**Málaga**), en el Parque de las Palomas (Patricia Macauley, com. por Andy Paterson).

BALEARS

- 1 ej., 13.10.2008, campo de golf de Son Muntaner, Palma (**Mallorca**) (Jordi Muntaner).

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., hembra, con 7 pollos recién eclosionados, 30.05.2008, río Tajo a su paso por la ciudad de **Toledo** (Luis Arroyo

Hernández), en el entorno del Campus Universitario de la Antigua Fábrica de Armas.

CASTILLA Y LEÓN

- 5 ej., 4 machos y 1 hembra, 18.10.2008, río Sil, Villaseca de Laciñana (**León**), en un pequeño embalse en el cauce encajado y represado del río, a 1 Km del pueblo (Jerónimo Corral, María Fernanda Genicio, José Luis González, Blanca García-Mon).

CATALUÑA

- 1 ej., hembra, 02.01.2008, Dosquers, Maià de Montcal (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: FTCA).
- 1 ej., hembra, 10-15.01.2008, resclosa de Serinyà (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: MLLA).

- 2 ej., 12.01.2008, alto Ter, entre Camprodón y Ripoll (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: FGPA, CGPC).
- 1 ej., 13.01.2008, estany de Graugés, Avià (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PABB).
- 1 ej., 19.01.2008, Embalse de Foix (Barcelona), observado hasta el 14.04 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PARA, CGGA, XPCA, PTEA, JCRE, XBGA, HSCA).
- 2 ej., 06.04.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en la laguna de la Murtra (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: RBVA).
- 1 ej., macho, 22.04.2008, desembocadura del río Tordera, Malgrat de Mar (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PABA, EBMA).
- 1 ej., macho, 25.11.2008, río Tenes, Parets del Vallès (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: OBDA).
- 1 ej., 26.11.2008, Embalse de Sant Ponç, Clariana de Cardener (**Lleida**), y también el 14.12 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: EPXA, JSXM, DMCA).
- 6 ej., 3 machos y 3 hembras, 04.12.2008, Embalse de Cellers, Castell de Mur (**Lleida**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: JPPE).
- 1 ej., macho, 18-25.12.2008, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), en el estany del Cortalet y la Massona (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PCXE, ALTA).

- 2 ej., macho y hembra, 20-28.12.2008, colònia Rosal, Olvan (**Barcelona**), previamente un macho el 01.01 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: PABB, MCXE).

EXTREMADURA

- 1 ej., macho, 26.01.2005, Embalse de Portaje (**Cáceres**) (Javier Prieta).
- 1 ej., 29.01.2006, Embalse del Cubilar, Navalvillar de Pela (**Badajoz**) (Álvaro Díaz Pastor).
- 2 ej., 12.03.2006, Garganta de los Infiernos, Jerte (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo).
- 1 ej., macho en eclipse, 01.10.2006, Embalse de Arrocampo (**Cáceres**) (Javier Briz).

MURCIA

- 1 ej., 25.01.2008, río Segura, dentro de la ciudad de **Murcia** (Vicente Giménez). Junto a un grupo de *Anas platyrhynchos*.
- 2 ej., machos, 28.12.2008, Cehegín, embalse de Argos (**Murcia**) (F.A. García Castellanos, J.L. Murcia).

PAIS VASCO

- 2 ej., machos, 26.01.2008, río Ibaizabal-Nervión, Bilbao (**Vizcaya**), a su paso por el barrio de la Peña. También vistos el 20.03 y el 13.04 (Serafín Alarcón, Conchi Mateos).
- 1 ej., 29.11.2008, Plaiaundi (**Guipúzcoa**) (Ricardo Rodríguez, Xabi Remírez).

Anas sibilatrix

silbón overo

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / –. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; **Años:** 02, 04-07; **Máx ind:** 2.

GALICIA

- 1 ej., quizás inmaduro, 24.08.2008, Lagunas de Riocaldo, Begonte (**Lugo**), visto también el 04.09. Con mancha

auricular clara. (José Otero, Eva Villares).
Fotos.



Anas sibilatrix. Begonte, Lugo, agosto 2008.
Foto: José Otero.

Anas cyanoptera

cerceta colorada ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / -**. Originaria de América.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03, 04, 07; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 10.05.2008, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**).
- También el 30.06 y el 08.11 en Gualta

(Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: AOTA, JMAA, ABRA).

Oxyura jamaicensis

malvasía canela ■

Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. **Categoría: C* E2 / -**. Originaria de América. Introducida principalmente como ave ornamental.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 02, 03, 05-07; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- 1 ej., hembra, 04.10.2008, Laguna de Medina, Jerez de la Frontera (**Cádiz**) (Paco Chiclana).

NAVARRA

- 2 ej., 11.01.2009, Laguna de Las Cañas o del Salobre, Viana (**Navarra**), junto a la ciudad de Logroño (Óscar Gutiérrez).

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 20.10.2008, Estany d'Ivars (**Lleida**) (Marc Llobet, Gerard Bota).

PHASIANIDAE

Coturnix japonica **nueva**

codorniz japonesa

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 /E2 . Originaria de Asia. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

BALEARS

- 1 ej., macho, 11.05.2008, Son Bosc, Muro (**Mallorca**), en campos de cereal, respondiendo al canto de un macho de *Coturnix coturnix* (Rafel Mas, G.C.).

MADRID

- Varios ej., 21.06.2008, Pinto (**Madrid**), capturados (Miguel Juan, com. por M. Martín). Fotos.



Coturnix japonica. Pinto, Madrid, junio 2008.
Foto: Miguel Juan.

Phasianus colchicus

faisán vulgar

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / E3 . Originaria de Asia. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 04-07; Máx ind: 48.

CATALUÑA

- 2 ej., machos, 18.01.2008, Castellet i la Gornal (**Barcelona**), en las viñas de Cal Corraler y en el Puig de l'Àliga. También un macho el 15.04 en la Bovera (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: (PTEA, JCRE, FCFA).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 28.12.2008, ciudad de **Valencia**, volando entre terrazas en un patio de vecinos entre las calles de la Fusta y Pintor Ferrer Calatayud. Tenía el pico "serrado", indicando origen de granja (José Luis Greño Ruiz). Fotos.

EXTREMADURA

- 1 ej., macho, 29.03.2004, Torrejón el Rubio (**Cáceres**) (Javier Briz).
- 1 ej., 18.06.2004, Navalmoral de la Mata (**Cáceres**) (Javier Briz).
- 1 ej., 06.06.2007, Villanueva de la Vera (**Cáceres**). En esta localidad fueron escuchados 2 ej. en 2005 (Dave Langlois).

- 5 ej., 3 machos y 2 hembras, 06.09.2008, Embalse de Portaje (**Cáceres**). Habían sido observados 3 machos y 1 hembra el 15.08. Posteriormente, 3 hembras el 17.10 (Sergio Mayordomo).
- 1 ej., macho, 21.11.2008, Santa Amalia (**Badajoz**) (J. P. Prieto Clemente).

NUMIDIDAE

Numida meleagris

pintada común

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E3 / E1**. Originaria de África. Introducida como especie cinegética.

Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 06; Máx ind: 1.

CANARIAS

- 7 ej., 22.02.2008, barranco de río Cabras (**Fuerteventura**) (Christopher Engelhardt).

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

pelicano común

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría: A E3 / -**

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 01, 04, 06; Máx ind: 3.

EXTREMADURA

- 1 ej., 26.11.2006, río Guadiana a su paso por Mérida (**Badajoz**) (M.J. Salguero).
- 1 ej., 09.03.2007, Embalse de Portaje (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo). También el 30.4 (César Clemente y Javier Mahillo).
- 1 ej., 22.09.2007, Charca del Ancho, Arroyo de la Luz (**Cáceres**). También el 21.10 (Florencio Carrero).
- 1 ej., 07.10.2007, Galisteo (**Cáceres**), en un arrozal en compañía de 49 cigüeñas blancas (Ricardo Montero y Sergio Mayordomo).

- 2 ej., 02.11.2007, en el vertedero de la ciudad de **Cáceres** (Florencio Carrero). Previamente 1 ej. el 19.10 (F. Carrero) y el 23.10 (Juan Manuel Brías),
- 1 ej., 08.01.2008, Embalse de Alqueva, Olivenza (**Badajoz**) (Juan G. Navedo, Jorge S. Gutiérrez, Mamen Molina y Francisco Capote). También 1 ej. el 13.05, con una anilla metálica en la pata izquierda (Juan G. Navedo).
- 2 ej., 10.01.2008, en el vertedero de la ciudad de **Cáceres**, uno con anilla negra en la pata izquierda (Florencio Carrero).

Pelecanus rufescens

pelicano rosado

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría: D E3 / D**. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 04; Máx ind: 1.

EXTREMADURA

- 1 ej., 05.2004, Embalse de Valdesalor (**Cáceres**) (M. Cardalliaguet), fotos. Identificado por J. Muddeman a partir de

una foto de 22.05 de Pedro Borrega publicada en Quercus 225:44 (com. por Javier Prieta y Sergio Mayordomo).

ARDEIDAE

Butorides striata **nueva**

garceta verde estriada ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de zonas tropicales.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 03.05.2008, desembocadura del Barranc de Carraixet, Alboraya (**Valencia**). Este ave procede, casi con toda seguridad, del escape, días antes, de ejemplares de ésta y otras especies del aviario del

Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia debido a la rotura del mismo por los fuertes vientos (com. por Toni Polo). Fotos.



Butorides striata. Alboraya, Valencia, mayo 2008. Foto: Rafael Muñoz.

CICONIIDAE

Leptoptilos crumeniferus

marabú africano ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / – . Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 02-04; Máx ind: 2.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 18.10.2008, Ojuelos, Marchena (**Sevilla**), en una charca en zona

semiestepárica. Llevaba anilla amarilla en la tibia izquierda (Paco Chiclana, Manolo Villaécija).

CASTILLA Y LEÓN

- 1 ej., 18.09.2008, Tobes, Tobes y Rahedo (**Burgos**) (Servicio de Medio Ambiente, com. por J.L. Carranza).
- 1 ej., 16.10.2008, **Ávila** (Juan Sagardia, Miguel Rouco), fotos. Es el mismo ejemplar visto en Burgos. Se ve luego en Cáceres.

EXTREMADURA

- 1 ej., 14.01.2004, en una charca entre las localidades de Cheles y Villanueva del

Fresno (**Badajoz**) (J. I. Ruiz de la Concha).

- 1 ej., 16.05.2005, Embalse de Guadiloba (**Cáceres**) (A. Mogena).
- 1 ej., 29.10.2008, Torrecilla, Plasencia (**Cáceres**) (J. Prieta). Es el mismo ejemplar visto anteriormente en Burgos y Ávila. Se vuelve a ver en Acehucho el 02.11 (Andrés Rodríguez) y el 06.11 (Iván Solana y Justiniano Julián). Fotos.

THRESKIORNITHIDAE

Geronticus eremita

ibis eremita

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos por la Junta de Andalucía (proyecto Eremita) en las costas de Cádiz con reproducción registrada. **Categoría: A E2 / -**.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; **Años:** 05, 07; **Máx ind:** 28.

ANDALUCÍA

- 3 ej., 2008, una pareja y un pollo, Barbate (**Cádiz**). La pareja, nacida en cautividad en el zoológico de Jerez y liberada en 2006 dentro del proyecto Eremita (Junta de Andalucía), consiguió criar un pollo en los

acantilados de Barbate durante la primavera de 2008 (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, *Quercus* 269:66; Zoobotánico de Jerez; *La Garcilla* 137:30).

Threskiornis aethiopicus

ibis sagrado

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 03-07; **Máx ind:** 5.

ASTURIAS

- 1 ej., 05.07.2008, ría de La Villa (**Asturias**) (Adolfo Villaverde, coaciosforum COA). Fotos.

ANDALUCÍA

- Grupos de hasta 10 ej., invierno y primavera de 2008, Doñana (**Huelva**). Intentos de cría en la colonia de moritos de la FAO. Uno de los ejemplares lleva anilla francesa (Carlos Dávila, Beltrán de Ceballos).
- 2 ej., 12.03.2008, P.N. de la desembocadura del río Guadalhorce (**Málaga**) (José Luis Postigo Sánchez).
- 3 ej., 14.06.2008, Cañada de las Norias, El Ejido (**Almería**). En una isla utilizada por canasteras y cigüeñuelas como lugar de

nidificación, son acosados por ejemplares de estas especies, especialmente de la segunda, mientras que las canasteras se limitaban a realizar exhibiciones (José M. López Martos), foto. Posteriormente 2 ej. el 14.07 también en una isleta, sin anillas o marcas y con comportamiento huidizo (Francisco Javier Molina, Manuel Arellano, Jose María González, Agustín García, Jose Luís G.), foto.

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 05.10.2008, embalse de la vega del Jabalón, Granatula de Calatrava (**Ciudad Real**), sin anillas ni marcas (Jorge Caminero, Carolina Pérez).



***Threskiornis aethiopicus*. San Pedro del Pinatar, Murcia, octubre 2008.
Foto: Diego Zamora Urán.**



***Threskiornis aethiopicus*. El Ejido, Almeria, junio 2008.
Foto: José M. Lopez Martos.**

CATALUÑA

- 1 ej., 06-08.09.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en Cal Tet (Anuari Ornít. Cat. 2008 – ICO: MLMB, AOTA, CFXB).
- 2 ej., 29.09.2008, isla de Buda, Delta del Ebro (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: MGXE i AAXF). También visto 1 ej. de primer invierno el 11.01, habiendo otras observaciones de 1 ej. hasta el 14.10.

EXTREMADURA

- 2 ej., pareja, 05.2004, centro de la provincia de **Cáceres**, posiblemente criando, observados varias veces con anterioridad (A. Toboso).
- 2 ej., 07.07.2004, Charca de los Arenales (**Cáceres**). El 22.08 entra 1 ej. en el dormitorio de ardeidas de Los Barruecos,

Malpartida de Cáceres (Marcelino Cardalliaguet).

- 1 ej., 01.05.2008, Embalse de Sierra Brava (**Cáceres**) (F. García Calle).
- 1 ej., 08.09.2008, Embalse de Corral Alto, Zorita (**Cáceres**) (David Jiménez Loro).

MURCIA

- 1 ej., 04.02.2008, La Puebla, Cartagena (**Murcia**) (J. Martínez Ródenas, A. Sallent Sánchez, C. Roland, Faunamurcia).
- 2 ej., 02.2008, Torre Pacheco, Campo de Cartagena (**Murcia**) (A. Sixto Coy, Faunamurcia).
- 1 ej., 15.10.2008, Las Encañizadas, San Pedro del Pinatar (**Murcia**) (Diego Zamora Urán), foto.

Eudocimus ruber *nueva*

corocoro rojo ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3/E3** – . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

COM. VALENCIANA

- Docenas de ejemplares, 21.04.2008, ciudad de **Valencia**. Escapados del aviario del Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, debido a la rotura de la red que cubre el aviario con el fuerte viento. Varios ejemplares fueron vistos merodeando por amplias zonas de la

ciudad, en especial en la zona marítima (com. por Toni Polo). El 01.05 fueron vistos 4 ej. en arrozales de Sueca, en L'Albufera, alimentándose de cangrejo americano (*Procambarus clarki*) (Bosco Dies). Las aves no tenían marcas ni anillas. Fotos.



***Eudocimus ruber*. L'Albufera, Valencia, mayo 2008.
 Foto: Bosco Dies.**

Platalea alba

espátula africana ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 /—. Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 03-05; Máx ind: 1.

EXTREMADURA

- 1 ej., 21.11.2005, Embalse de Los Canchales (**Badajoz**), junto a 2 espátulas comunes (J. A. García).

Platalea ajaja *nueva*

espátula rosada ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 /—. Originaria de Centro y Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: —; Años: —; Máx ind: —.

COM. VALENCIANA

- Docenas de ejemplares, 21.04.2008, ciudad de **Valencia**. Escapados del aviario del Oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, debido a la rotura de la red que cubre el aviario con el fuerte

viento. Varios ejemplares fueron vistos merodeando por amplias zonas de la ciudad, en especial en la zona marítima. Al día siguiente fue visto 1 ej. en vuelo sobre el Racó de l'Olla (com. por Toni Polo).



***Platalea ajaja* (derecha) y *Eudocimus ruber* (izquierda).
Oceanográfico de Valencia, abril 2008. Foto: Estudi Verd SL.**

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

flamenco del Caribe ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Centro y Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 05-07; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 29.10.2008, punta de la Banya, Delta del Ebro (**Tarragona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 – ICO: RGBA).

Phoenicopterus minor

flamenco enano ■

Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / D E3 . Originaria de África, India.
Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 04-07; Máx ind: 7.

CATALUÑA

- 3 ej., 06-16.01.2008, Delta del Ebro (**Tarragona**). Existen también diversas observaciones en la punta de la Banya, con

2 ej. el 12.07 (Anuari Ornít. Cat. 2008 – ICO: PDEA, DBCA, JPVF, TKKA).

ACCIPITRIDAE

Elanus caeruleus **nueva**

elanio común ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / – .
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CATALUÑA

- 1 ej., 30.03.2008, Fervosa, Manlleu (**Barcelona**) (Andrés García).

Haliaeetus vocifer

pigargo vocinglero ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 07; Máx ind: 1.

CASTILLA-LA MANCHA

- 1 ej., 21.09.2008, cola del embalse de Cazalegas (**Toledo**) (Christophe Pontegnie). Seguramente se trata del mismo ejemplar visto en 2007, ahora con plumaje casi adulto (cabeza y espalda

blanca con manchas marrones, cola completamente blanca), aunque no había sido visto en todo este tiempo. Quizás escapado de un parque en Hinojosa de San Vicente.

Haliaeetus leucocephalus **nueva**

pigargo americano

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Norteamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CATALUÑA

- 1 ej., 30.03.2008, Lluçà (**Barcelona**) (Ramón Baucells). Escapada del zoo Cim d'Àligues.

Parabuteo unicinctus

busardo mixto

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Originaria de Centro y Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-07; Máx ind: 1.

ANDALUCÍA

- En 2008 se confirmó la cría de una pareja en el Parque del Alamillo (**Sevilla**). La hembra, que llevaba pihuelas, y los pollos

fueron capturados posteriormente por la Consejería de Medio Ambiente y llevados al CREA (com. por Alberto Plata).

Geranoaetus melanoleucus

águila mora

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.
Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 02-07; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 16.03.2008, Cases Velles de Formentor, Pollença (**Mallorca**). También

el 06.04 (G.C., Rafel Mas). Parece ser el mismo ejemplar visto en años anteriores.

Aquila rapax **nueva**

águila rapaz

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África. Utilizada en cetrería, con escapes registrados.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCÍA

- 1 ej., 06.10.2008, Albuñol (**Granada**), ejemplar de cetrería escapado, con anillas, pihuelas, cascabeles, etc, fue recapturado

y conducido al CREA de Granada (com. por Isabel Molina).

Aquila chrysaetos

águila real

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** A E3 / – . Utilizada en cetrería, con escapes registrados.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 04-07; Máx ind: 1.

BALEARS

- 1 ej., 16.03.2008, Cases Velles de Formentor, Pollença (**Mallorca**), bicinta con dos pihuelas (G.C., Rafel Mas).

GRUIDAE

Balearica regulorum

grulla coronada cuelligrís

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3. Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: 3; Años: 06-08; Máx ind: 2.

CANARIAS

• 1 ej., 06.07.2008, Morro Jable (Fuerteventura). Seguramente se trata del mismo ejemplar ya presente en la zona

desde 12.2007 (Luis Aurelio Alvarez Usategui).

COLUMBIDAE

Caloenas nicobarica *nueva*

paloma de Nicobar

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / –. Originaria de sudeste asiático.
Ant. Noticiarios: Citas: –; Años: –; Máx ind: –.

PAIS VASCO

• 1 ej., 01.10.2008, centro urbano de Elgoibar (Guipúzcoa). Tras intentar ser capturada por la Policía Municipal, se refugió en una zona arbolada cercana (Aitor Zabala, com. por Josema, SEO/Donosti). Parece tratarse de un

ejemplar enviado a un coleccionista de la zona por un criador de Sevilla. Posiblemente se trata de un juvenil, por estar mudando algunas plumas y por la escasa protuberancia del pico (J.C. Fernández-Ordóñez).



Caloenas nicobarica. Elgoibar, Guipúzcoa, octubre 2008.
Foto: Aitor Zabala.

Columba livia var. domestica

paloma doméstica ■

Especie (variedad) doméstica establecida. **Categoría:** C / C . Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa. Introducida con diversas finalidades.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ESPAÑA

- Especie (variedad) establecida y con distribución generalizada por todo el

territorio, especialmente en los núcleos urbanos.

Streptopelia senegalensis

tórtola senegalesa ■

Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos observados de forma ocasional. **Categoría:** D E3 / A E3 . Originaria de África, Asia.

Ant. Noticiarios: Citas: 2 ; Años: 04, 05 ; Máx ind: 1 .

CATALUÑA

- 1 ej., 01.07.2008, Rabós (**Girona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: ABRA).

Geopelia cuneata

tortolita diamante ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Australia.

Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 02, 03, 05-07; Máx ind: 1.

MADRID

- 1 ej., 06.10.2008, cerro del Telégrafo, Rivas-Vaciamadrid (**Madrid**), con dificultades para levantar el vuelo (Sergio de Santos, Luis C. Ortiz).

MURCIA

- 1 ej., 24.07.2008, Cartagena (**Murcia**), leucístico o albino. (Antonio Jesús Hernández Navarro, Diego Zamora).



***Geopelia cuneata*.**
Rivas-Vaciamadrid, Madrid,
octubre 2008.
Foto: Raúl Urquiaga.

Columbina cruziana

tortolita quiquagua ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: 2 ; Años: 04 ; Máx ind: 1 .

BALEARS

- 1 ej., macho, 30.09.2008, Ses Jonqueres Veres, Sa Pobla (**Mallorca**), volando en un

prado entre un grupo de *Passer domesticus* (Rafel Mas, G.C.).

CACATUIDAE

Nymphicus hollandicus

cacatúa ninfa ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E3 / E2 . Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03, 05-07; Máx ind: 7.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 13.05.2008, P.N. desembocadura del río Guadalhorce (**Málaga**), comiendo en

el carril junto al mirador de la laguna grande (Antonio Toro), foto.



***Nymphicus hollandicus* (macho). Río Guadalhorce, Málaga, mayo 2008.
Foto: Antonio Toro.**

CATALUÑA

- 1 ej., 03.08.2008, Sant Llorenç de la Muga (**Girona**), siendo después observada durante las dos primeras semanas de agosto (Jaume Castellà), fotos.
- 1 ej., 23.08.2008, Campllong (**Girona**), y también el 24.09 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: TMXC, ADGA).

- 1 ej., 24-26.09.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**). También el 02.10 y 20.10 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: RBVA).

GALICIA

- 1 ej., 12.02.2008, Xunqueira de Alba, **Pontevedra**, continuamente emitiendo reclamos (Vítor Xosé Cabaleiro Barroso).



Nymphicus hollandicus.
St. Llorenç de la Muga, Girona, agosto 2008.
Foto: Jaume Castellà.

PSITTACIDAE

Platycercus eximius

perico multicolor

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 6; Años: 04-07; Máx ind: 1.

GALICIA

- 1 ej., macho, con rasgos de la subespecie *P. e. eximius*, 07.2007, litoral de Rons, O Grove (**Pontevedra**). Capturado y mantenido en cautividad hasta

al menos el 22.06.2008. Anilla en tarso izquierdo, código: (Z) III 488 191 (Elsa Remigio, Cosme D. Romai).

Psephotus haematonotus

perico dorsirrojo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 1 ; Años: 07 ; Máx ind: 1.

CATALUÑA

- 1 ej., 28.04.2008, ciudad de **Barcelona**, en el barrio de Sant Andreu (Jordi Clavell).

Melopsittacus undulatus

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E3 / E2**. Originaria de Australia. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-07; Máx ind: 2.

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 03.03.2008, Jardín botánico, ciudad de **Valencia** (José Luis Greño Ruiz).

periquito común

MURCIA

- 1 ej., 25.05.2008, La Puebla, Cartagena (**Murcia**) (A. Sallent Sánchez), en una zona agrícola.

Psittacula krameri

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de África, India. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-07; Máx ind: 20.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 2007, **Sevilla**. Ya años antes, 1 ej. en 2002 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por J.M. Romero).
- 1 ej., 15.04.2008, en el casco urbano de **Córdoba** (José María Ayala Moreno).
- 18 ej., 20.11.2008, P.N. desembocadura del río Guadalhorce, (**Málaga**), volando en dirección norte (Blas López).

ASTURIAS

- Al menos 11 ej., machos y hembras, durante 2008, parque de Isabel la Católica, Gijón (**Asturias**), existiendo un dormidero en los eucaliptos de la zona conocida como "El kilómetro" (Ignacio Vega).

BALEARS

- 5 ej., 09.02.2008, Predi de Son Pax, Palma (**Mallorca**), en una zona de campos de naranjos. En el mismo lugar es capturado el 25.07 un ejemplar azul con anilla de criador, cerrada y de aluminio azul (213 FTS 02). Posteriormente son vistos 2 ej. el 24.10 (Rafel Mas, G.C.).

CATALUÑA

- 9 ej., 21.01.2008, Sant Joan Despí (**Barcelona**) (Jordi Clavell).
- 2 ej., 25.02.2008, Besalú (**Girona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: MLLA)
- 34 ej., 01.04.2008, en el parque Diagonal Mar de Badalona (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RRSB). El 16.10 se observan más de 30 ej. en el barrio del Gorg (Artur Degollada).
- 2 ej., pareja, 13.06.2008, Molins de Rei (**Barcelona**), nidificando en un plátano *Platanus hispanica*, en la plaza de la iglesia (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CFMA).
- 15 ej., 05.07.2008, ciudad de **Girona**, presentes durante todo el año en la ciudad,

alejandrino común

con posible nidificación en una palmera (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CPVA, PFLB, AAXD, MRXA)

- 1 ej., 16-23.07.2008, Gurb (**Barcelona**), también entre el 4-15.08 (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RJNA).
- 11 ej., algunos juveniles, 11.08.2008, Cornellà de Llobregat (**Barcelona**), en el parque Can Mercader (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RGLA). También varios ej. el 22.12.2008, presentes durante todo el año (David Estepa), fotos.
- 14 ej., 14.09.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en el camino de Valencia, con varias observaciones durante el año (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RBVA).
- 3 ej., 29.09.2008, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), en el estany Europa (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RBVA, SSXA).
- Cerca de 20 ej., de 10.2008 a 12.2008, Molins de Rei (**Barcelona**), en el Parque Mariona, fotos. También al menos 2 parejas en los Aiguamolls, durante todo el año (David Estepa).
- 5 ej., 15.11.2008, monasterio de Pedralbes, Barcelona (**Barcelona**) volando sobre los jardines (Pedro Bescós).
- 8 ej., 16.12.2008, Sant Feliu de Llobregat (**Barcelona**), vistos durante todo el año en el Parque Torreblanca. Vistos también 6 ej. en el Parque Nadal y en el Parque Falguera (David Estepa).
- Varios ej., 22.12.2008, ciudad de **Barcelona**, en el Parque de la Ciutadella, donde están presentes durante todo el año. Se observa competición por huecos en que anidar con *Aratinga acuticaudata* y *Poicephalus senegalus* (David Estepa), fotos.

COM. VALENCIANA

- 30-42 ej., 25.12.2008, en el antiguo cauce del Turia, ciudad de **Valencia**, entre ellos un grupo de ocho alimentándose de los frutos de un cinamomo (*Melia* sp.) (José Luis Greño Ruiz, José Luis Greño Hidalgo). Existen otras citas de la especie en la ciudad durante todo el año: 2 ej., 21.02, en el cementerio municipal; 5 ej., 25.02 y 20.10, en el Jardín botánico; 2 ej., 06.03, en el pasaje Albereda; 4 ej., 10.06, en los viveros; 3 ej., 10.12, plaza de Monteolivet (José Luis Greño Ruiz); 3 ej., 10.12, en la calle Poeta Mas i Ros (J.L. Greño Ruiz, Esperanza Ruíz Fernández);
- 9 ej., 22.11.2008, parque Ribalta, ciudad de **Castellón** (J.L. Greño Ruiz), fotos.

EXTREMADURA

- 1 ej., 17.07.2005, Belvís de Monroy (**Cáceres**), hasta el 31.07 (Javier Briz)
- 1 ej., 07.10.2006, Embalse de Arrocampo (**Cáceres**) (J. Briz y O. González).
- 1 ej., 01.06.2007, Plasencia (**Cáceres**) (Ricardo Montero).

MADRID

- 5 ej., 22.11.2008, en IFEMA, en **Madrid** (David Olmos).

MURCIA

- 1 ej., 16.07.2008, La Manga del Mar Menor, Cartagena (**Murcia**) (A. Fernández-Caro). Posible nido.
- 5 ej., 15.11.2008, Zairaiche (**Murcia**) (F.A. García Castellanos). Ya habían sido vistos 4 ej. el 08.09.



Psittacula krameri.
Valencia, marzo 2008.
Foto: José Luis Greño.

Agapornis roseicollis

inseparable pecho rosado ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-07; Máx ind: 3.

CATALUÑA

- 1 ej., 25.06.2008, ciudad de **Barcelona**, en el barrio de Poblenou (Xavier Tomás).

COM. VALENCIANA

- 1 ej., 25.04.2008, Vila-real (**Castellón**), capturada posteriormente, lleva anilla que indica su cría en cautividad (Arantza Leal).

Agapornis fischeri

insepar. cabeza melocotón ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E3 / E2 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 05-07; Máx ind: 10.

CATALUÑA

- 2 ej., 28.06.2008, Molins de Rei (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: CFMA, RDSA).

MADRID

- 1 ej., 30.04.2008, calle Gral. Cadenas Campos, ciudad de **Madrid**, en una zona cercana a la Dehesa de la Villa, comiendo leguminosas en un árbol (Antonio Alonso, Rosa Peña).

Agapornis nigrigenis **nueva**

insepar. mejillas negras ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / — . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: — ; Años: — ; Máx ind: — .

PAIS VASCO

- 2 ej., 30.04.2008, parque Doña Casilda, Bilbao (**Vizcaya**) (Serafín Alarcón).

Poicephalus senegalus

lorito senegalés ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-07; Máx ind: 4.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 26-30.04.2008, centro de la ciudad de **Málaga**, comiendo diariamente por las

mañanas en un níspero (Antonio Toro), fotos.



Poicephalus senegalus. Málaga, abril 2008.
Foto: Antonio Toro.

CATALUÑA

• 2 ej., 22.12.2008, ciudad de **Barcelona**, en el Parque de la Ciutadella, donde están presentes todo el año (David Estepa). Una pareja cría con éxito en el interior del Parque Zoológico (Josep García).

EXTREMADURA

• 1 ej., posiblemente de la subespecie *P. s. senegalus*, 22.09.2008, Valencia de

Alcántara (**Cáceres**), comiendo hojas de un eucalipto del Convento de San Francisco (Alfonso Pulgar).

MURCIA

• 3 ej., 08.09.2008, Zairaiche (**Murcia**) (F.A. García Castellanos, Faunamurcia). Vistos también 2 ej. el 15.11.

Aratinga acuticaudata

cotorra cabeciazul

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-07; Máx ind: 8.

CATALUÑA

• 3 ej., 01.03.2008, marisma del Remolar, Delta del Llobregat (**Barcelona**), también el 12.03 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: STVB, FLSA, PBGA).

• 20 ej., 20.04.2008, ciudad de **Barcelona**, en el parque Diagonal Mar. También 15 ej. el 19.01 comiendo frutos de *Schinus molle* (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: RRSB, SHVA).

• 6 ej., 22.12.2008, ciudad de **Barcelona**, en el Parque de la Ciutadella, donde están presentes todo el año formando parejas o

tríos, un ejemplar emparejado con una *Aratinga* sp. (quizás *wagleri*) (David Estepa), fotos.

COM. VALENCIANA

• 1 ej., 05.2008, Hondón de los Frailes (**Alicante**) (Pedro López Martínez), fotos.

GALICIA

• 1 ej., 01.01.2007, O Grove (**Pontevedra**), en la playa de Con Roibo, observado regularmente hasta el 29.09 (Cosme Damián), fotos.

Aratinga mitrata

cotorra frontir. boliviana

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / -**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03, 05-07; Máx ind: 52.

CATALUÑA

• 68 ej., 09.01.2008, Parque Zoológico de la ciudad de **Barcelona** (Josep García). La especie está presente durante todo el año en el Parque de la Ciutadella (David Estepa), fotos.

• 15-20 ej., 15.01.2008, ciudad de **Barcelona** (Antonio Rodríguez Sinovas), entre las calles Floridablanca y Calabria. Una pareja está presente todo el año en el Hospital de Sant Pau (Xavier Tomás).

Aratinga erythrogenys

cotorra frontir. ecuatoriana

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / -**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03, 05-07; Máx ind: 40.

COM. VALENCIANA

• 23 ej., del 11.02 al 03.03.2008, Jardín botánico de la ciudad de **Valencia**, siendo vistos también 15 ej. el 20.10 y 13 ej. el

22.12. También en la ciudad de Valencia, 15 ej. el 27.02 en el cruce de la Av. Cataluña con Primat Reig (José Luis Greño Ruiz).

Aratinga jandaya **nueva**

cotorra jandaya

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

CATALUÑA

- 1 ej., 25.10.2008, ciudad de **Barcelona**, en el barrio de Sant Andreu (Jordi Clavell).

Nandayus nenday

cotorra cabecinegra

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E2 . Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 05-07; Máx ind: 4.

CATALUÑA

- 2 ej., 02.06.2008, Montcada i Reixac (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: RGLA).
- 15 ej. 15.07.2008, Parque Zoológico de la ciudad de **Barcelona** (Josep García). También 6 ej. el 06.04 y 12 ej. el 14.09

(Jordi Clavell). La especie está presente durante todo el año en el Parque de la Ciutadella, utilizando huecos de árboles (David Estepa), fotos. También 11 ej. el 04.08 en la calle Marina (Xavier Tomás).

Cyanoliseus patagonus

cotorra barranquera

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3 . Originaria de Sudamérica.

Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-07; Máx ind: 8.

ANDALUCIA

- 1 ej., 2001 ó 2002, Chiclana de la Frontera (**Cádiz**), en una zona de huertas. Capturada posteriormente (Rafael García Costales).
- 1 ej., 11.11.2008, El Puerto de Santa María (**Cádiz**) sobre una araucaria y realizando vuelos cortos a la azotea de un piso cercano, no lleva anillas ni marcas (Rafael García Costales), foto.

ARAGÓN

- 1 ej., 07.06.2008, El Vedado, Zuera (**Zaragoza**), en una finca agrícola con

arbolado y construcciones diversas (casas, almacenes, naves). También visto el 07.08 (Javier Sampietro, Javier Sanz, José Luis Rivas), fotos.

CATALUÑA

- 1 ej., 13.10.2008, Mollerussa (**Lleida**) (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: FMSA).

MURCIA


- 1 ej., 04.05.2008, La Manga, San Javier (**Murcia**) (P.J. Jiménez Montalbán).



***Cyanoliseus patagonus*. El Puerto de Sta. María, Cádiz,
noviembre 2008. Foto: Rafael García Costales.**



***Cyanoliseus patagonus*. Zuera, Zaragoza, junio 2008.
Foto: José Luis Rivas.**

Myiopsitta monachus**cotorra de pecho gris** 

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; **Años:** 02-07; **Máx ind:** 60.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 2006, **Sevilla**. Años antes, 1 ej. en 1999 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por J.M. Romero).
- Varios ejemplares, 2008, El Puerto de Santa María (**Cádiz**). La especie está asentada en la localidad, tanto en el centro como en las afueras, con varias colonias en palmeras (Rafael García Costales).
- Varios ejemplares, 06.2008, P. N. desembocadura del Guadalhorce (**Málaga**), comiendo semillas de pepinillo del diablo *Ecballium elaterium* (Antonio Miguel Pérez), foto. También fueron observados comiendo semillas de cardos *Silybum marianum* y *Onopordum acanthium*.

BALEARS

- 12 ej., 01.02.2008, Anfiteatre de la falca verda, Palma (**Mallorca**). Posteriormente, 6 ej. el 05.10 en el Predi de Son Pax, Palma, sobrevolando campos de naranjos (Rafel Mas).

CATALUÑA

- 38 ej., 12.01.2008, Salats i Muntanyans, Torredembarra (**Tarragona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: AVDA).
- 1 ej., 28.01.2008, Sant Pere Sacarrera, Mediona (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: XBGA).
- 1 ej., 14.03.2008, aeropuerto de Reus (**Tarragona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: ABBB).
- 20 ej., 15.03.2008, Areny del Molí, Olesa de Montserrat (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: ACXK, JCRD).
- 1 ej., 02.04.2008, Olot (**Girona**), en el Pont de Ferro, arreglando un nido construido en *Platanus hispanica* (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: FTCA).
- 6 ej., de 10.2008 a 12.2008, Molins de Rei (**Barcelona**), en el Parque Mariona, no se observan nidos, fotos. También al menos 2 parejas en los Aiguamolls, durante todo el año (David Estepa).
- 10-20 ej., 11.2008 y 12.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**) (Antonio Rodríguez Sinovas).
- 1 ej., 12.12.2008, Torregrossa (**Lleida**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: FMSA).
- 104 ej., 14.12.2008, ciudad de **Barcelona**, en el paseo de Sant Joan, registrados durante un seguimiento

ornitológico (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: DMVB).

- 10 ej., 16.12.2008, Sant Feliu de Llobregat (**Barcelona**), en el Parque Torreblanca, donde están presentes durante todo el año, con 2 nidos. Vistos también 6 ej. en el Parque Nadal, con 2 nidos, y en el Parque Falguera, con 1 nido (David Estepa).
- Varios ej., 22.12.2008, Cornellà de Llobregat (**Barcelona**), en el Parque Can Mercader, con 8 nidos compuestos (David Estepa), fotos.
- Varios ej., 22.12.2008, ciudad de **Barcelona**, en el Parque de la Ciutadella, donde están presentes durante todo el año (David Estepa), fotos.

COM. VALENCIANA

- 5 ej., 28.02.2008, Pla de l'Arc, Llíria (**Valencia**), primer registro de la especie en esta localidad (Toni Polo Aparisi).
- 1 ej., 10.2008, desembocadura del río Algar, Altea (**Alicante**) (Luis Fidel Sarmiento).
- 4 ej., 29.12.2008, ciudad de **Valencia** (Jose Luis Greño).

MURCIA

- 3 ej., 13.04.2008, Yecla (**Murcia**) (A. Ortuño). Siguen presentes 2 ej. el 08.05.
- 5 nidos, 12.05.2008, La Manga del Mar Menor, Cartagena (**Murcia**) (A. Silvente Ortega).
- 4 ej., 09.06.2008, centro urbano de Cartagena (**Murcia**) (A. Fernández-Caro). El 22.12 fueron observados 4 ej. en la misma ciudad (J. Ortega).
- 4 ej., 15.07.2008, San Pedro del Pinatar (**Murcia**) (Vicente Giménez).
- 20 ej., 11.08.2008, San Javier (**Murcia**) (Vicente Giménez Vicente). Vistas cerca de la salida de la autovía A-30, en dos grupos de 6 y 14 ejemplares. También se vieron 3 ej. el mes anterior en el Parque Almansa, en el centro de San Javier.
- 30 ej., 20.11.2008, Salinas de Marchamalo, Cartagena (**Murcia**) (R. Howard, Faunamurcia).

PAIS VASCO

- 1 ej., 30.04.2008, Bilbao (**Vizcaya**), volando cerca del polideportivo de la Casilla (Serafín Alarcón).



Myiopsitta monachus.
San Javier, Murcia,
agosto 2008.
Foto:
Vicente Gimenez.

Amazona aestiva

amazona frentiazul

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría: E2 / E3**. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 9; Años: 04-07; Máx ind: 5.

CATALUÑA

- 1 ej., de la subespecie *A. e. xanthopteryx*, 30.09.2008, en la desembocadura del río

Tordera (**Barcelona**) (Javier Romera).
Foto.



Amazona aestiva.
Río Tordera, Barcelona,
setiembre 2008.
Foto: Javier Romera.

COM. VALENCIANA

• 3 ej., el 20.10.2008, Jardín botánico de la ciudad de **Valencia**. Previamente, visto 1 ej. el 03.03. También en la ciudad de

Valencia, 1 ej. el 10.06 en el cruce de la Av. Blasco Ibáñez con Jaime Roig (José Luis Greño Ruiz).

BUCEROTIDAE

Ceratogymna brevis *nueva*

cáloa cariplateado ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / -** . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: - ; Años: - ; Máx ind: - .

PAIS VASCO

• 1 ej., 23.05.2008, Laguardia (**Álava**) (Iván Sarabia), fotos. Continúa el 09.06 (Sergio

de Juan), fotos. Ejemplar posiblemente escapado de un zoo cercano.



Ceratogymna brevis.
Laguardia, Álava,
mayo 2008.
Foto:
Iván Sarabia.

PYCNONOTIDAE

Pycnonotus jocosus

bulbul orfeo ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E2** . Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 98, 00, 01, 03-07; Máx ind: 15.

COM. VALENCIANA

• 3 ej., pollos recién nacidos, 29.04.2008, La Cañada, Paterna (**Valencia**) (Juan A. L. Andreu, com. por Toni Polo), fotos.



Pycnonotus jocosus.
Paterna, Valencia,
abril 2008. Foto:
Juan A. L. Andreu.

Pycnonotus cafer

bulbul cafre ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3** . Originaria de India.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 02-04, 06; Máx ind: 3.

ANDALUCÍA

• 1 ej., 29.06.2008, Torremolinos (**Málaga**), en Montemar, la misma zona donde se ven al menos 2 ejemplares desde 2006. Estas aves no parecen ser del mismo núcleo reproductor localizado por Andy Paterson en 2002-2003 (Blas López).

COM. VALENCIANA

• 1 ej., 26.09.2008, cala Cantalar, cabo Huertas (**Alicante**). Posado tanto en el suelo como en arbustos, en una zona de acantilados de areniskas muy próxima del mar, con vegetación mediterránea de arbustos y matas (Miguel Ángel Andrés Moreno), fotos.



Pycnonotus cafer.
Cabo Huertas, Alicante,
setiembre 2008.
Foto: Miguel Ángel
Andrés Moreno.

TIMALIIDAE

Leiothrix lutea

ruiseñor del Japón ■

Especie exótica establecida. **Categoría: C / E2**. Originaria de China. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 97, 03-07; Máx ind: 17.

CATALUÑA

- 2 ej., 08.05.2008, Teià (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: MLMB).
- 3 ej., 05.07.2008, Sierra de Collserola, en el municipio de Sant Just Desvern (**Barcelona**) (Antonio Rodríguez Sinovas)
- 5 ej., 3 juveniles, 28.07.2008, Serrat del Vent, Corbera de Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: CFMA).
- Grupo numeroso, 10.08.2008, parque de la Serralada de Marina, Vall de Reixac, Montcada (**Barcelona**) (Ramiro Aibar Pujol). Esta es la zona de Barcelona donde la especie parece ser actualmente más abundante, con grupos de hasta 87 ej., expandiéndose la especie desde la Sierra de Collserola (Joan Carles Fernández-Ordóñez).

- 5 ej., 27.09.2008, El Papiol (**Barcelona**), anillados en las Escletxes (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: CFMA)
- 20 ej., 05.12.2008, Sant Fost de Campsentelles (**Barcelona**), con varios ejemplares ya anillados previamente en el mismo lugar (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: MLMB).
- 53 ej., 2008, Can Balasc, **Barcelona**, capturados durante todo el año en una estación de anillamiento (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: SSAA).

MADRID

- 2 ej., 07.08.2008, zona de El Sotillo, Villaviciosa de Odón (**Madrid**), junto a la ribera del río Guadarrama (VK26) (Justina Pérez Martín).

STURNIDAE

Gracula religiosa

miná del Himalaya ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3**. Originaria de India, sudeste asiático.

Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 04, 05, 07; Máx ind: 3.

ARAGÓN

- 1 ej., 25.10.2008, Monzón (**Huesca**) en los alrededores de la pista de atletismo, en una zona de huertas, mostrando una actitud confiada (Marcos Pérez Osanz, Ester Osanz Puente).

CATALUÑA

- 1 ej., 24.04.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en la pineda de Cal Tet (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: RBVA, APSA).

Acridotheres tristis

miná común ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E2 / E1**. Originaria de India, sudeste asiático.

Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 03-07; Máx ind: 12.

CANARIAS

- 4-5 ej., 2 adultos y 2-3 crías, 03.07.2008, La Lajita (**Fuerteventura**). Una pareja cebando 2-3 crías en una caja nido de madera artificial, probablemente preparada para tórtolas (Unai Fuente Gómez, Justina Pérez Martín), fotos.

- 30 ej., 2008, **Fuerteventura**. Fue realizado por Susana Saavedra (Live Arico) un control de la población existente en la isla. La población, de unos 30 ejemplares, tuvo su origen en ejemplares escapados en 2006 de un parque zoológico. La campaña de control, con una duración de diez días,

consiguió capturar 24 ej., quedando al menos 4 ej. en libertad.

- 1 ej., adulto, 20.08.2008, parque La Granja, Santa Cruz (**Tenerife**) (Rafael Vicente Ávila).

CATALUÑA

- 1 ej., 15.04.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**). Visto también el 24.04 (Anuari

Ornit. Cat. 2008 - ICO: PBGA, JBOL, JCPA, RSPA).

GALICIA

- 1 ej., 03.2008, Moscoso, Pazos de Borbén (**Pontevedra**), muy conñado. Continúa hasta 12.2008, posiblemente sin sobrevivir al invierno siguiente (Álvaro Martínez Leiro, Vitor Xosé Cabaleiro Barroso).



Acridotheres tristis.
La Lajita, Fuerteventura,
julio 2008.
Foto: Justina Pérez.

Acridotheres ginginianus

miná oscuro ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de India.

Ant. Noticiarios: Citas: 2; Años: 03, 06; Máx ind: 2.

CANARIAS

- 2 ej., 27-28.06.2008, Taguluche, Valle Gran Rey (**La Gomera**). Ambos días se les vio comiendo en una higuera y luego

desplazándose hacia unas casas, siempre juntos (Beatriz Fariña Trujillo, com. por Toño Lorenzo).

Gracupica nigricollis

estornino cuellinegro ■

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / – . Originaria del sudeste asiático.

Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 2 ; Años: 07 ; Máx ind: 1 .

ANDALUCIA

- 1 ej., durante 2008, Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas (**Málaga**) (Juan Ignacio Alvarez Gil). Existen diversas observaciones los días 12.01, 13.03, 19.06

y 10-16.10. Y también en 12.2008 y 01.2009 (J.A. Campos). Seguramente se trata del mismo ejemplar observado en el mismo lugar ya en 2007.

Lamprotornis superbus

estornino soberbio

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: 4; Años: 03, 06, 07; Máx ind: 2.

CATALUÑA

- 1 ej., 08.10.2008, Collbató (**Barcelona**). También los días 15-31.12 (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: JCGF, NFXA).

PLOCEIDAE

Ploceus intermedius **nueva**

tejedor enmascarado chico

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: –.

ANDALUCIA

- 5 ej., 2002, **Sevilla**, capturados para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).

Ploceus cucullatus

tejedor cogullado

Especie exótica, con reproducción registrada. **Categoría:** E2 / E3. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: 1 ; Años: 05 ; Máx ind: 1.

ANDALUCIA

- 1 ej., 2006, **Sevilla**, capturado para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).

Ploceus melanocephalus

tejedor de cabeza negra

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría:** E1 / – . Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 03-07; Máx ind: 10-12.

ANDALUCIA

- 35 ej., 2007, **Sevilla**, capturados para anillamiento. Previamente, 1 ej. en 2002, 3 ej. en 2003, 3 ej. en 2004, 19 ej. en 2005 y 17 ej. en 2006 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- 134 ej., 2008, **Sevilla**, capturados para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- Varios ejemplares, 20.09.2008, brazo del este, Doñana (**Sevilla**) (Paco Chiclana).

BALEARS

- 1 ej., 26.10.2008, Santa Eulàlia (**Eivissa**) (Stephen Dunstan). Visto en la desembocadura de un río, junto a gorriones *Passer domesticus*, en una zona de alimentación de patos domésticos.

CATALUÑA

- 1 ej., macho, 09.2008, desembocadura del río Tordera (**Barcelona**) (Javier Romera).
- 1 ej., macho, 12.10.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en Cal Tet (Anuari Ornít. Cat. 2008 - ICO: RBVA).



Ploceus melanocephalus.
Brazo del este, Sevilla,
abril 2008. Foto:
Grupo Ornitológico
del Sur (GOSUR).

Euplectes afer

tejedor amarillo ■

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E3**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).
Ant. Noticiarios: Citas: + ; Años: 02-07; Máx ind: +200.

ANDALUCIA

- 18 ej., 2007, **Sevilla**, capturados para anillamiento. Previamente, 2 ej. en 1998, 1 ej. en 2000, 1 ej. en 2001, 4 ej. en 2002, 9 ej. en 2004, 3 ej. en 2005 y 6 ej. en 2006 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- 48 ej., 2008, **Sevilla**, capturados para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- Numerosos ejemplares, 20.09.2008, brazo del este, Doñana (**Sevilla**) (Paco Chiclana). Se observaron numerosos grupos familiares sobrevolando el humedal.

CATALUÑA

- 15 ej., 09.12.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en el itinerario de Els Reguerons. También 1 ej. el 17.08, 31.08 y 03.09 (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: RGLA, RBVA, STVB).
- 8 ej., 06.09.2008, desembocadura del río Tordera, Malgrat de Mar (**Barcelona**) (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: MGVA).

- 3 ej., pollos voladeros, 02.07.2008, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (**Girona**), en el estany Europa (Anuari Ornit. Cat. 2008 - ICO: JMAA).

COM. VALENCIANA

- 3 ej, 2 machos y 1 hembra, 2004, P.N. de Marjal de Pegó-Oliva (**Alacant**) (Fran). La hembra fue anillada y presentaba placa incubadora activa.
- 1 ej., 09.2008, embalse de Bellús, La Vall d'Albaida (**Valencia**) (José Ventura, com. por Toni Polo), foto.

EXTREMADURA

- 1 ej., macho, 08.2004, Galisteo (**Cáceres**) (com. por Javier Prieta), fotos.
- En 2008, se estima haber una pequeña población cerca de la ciudad de **Badajoz**, con más de 5 parejas (Javier Prieta y Sergio Mayordomo).

Euplectes hordaceus

tejedor de corona roja ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de África.

Ant. Noticiarios: Citas: 1 ; Años: 07 ; Máx ind: 1.

ANDALUCIA

- 1 ej., 06.10.2008, río Vélez (**Málaga**) (Miguel Peláez). Se movía dentro de un

grupo de gorriones comunes, *Passer domesticus*.



***Euplectes hordaceus*.**
Río Vélez, Málaga,
octubre 2008.
Foto: M. Pelaez.

ESTRILDIDAE

Amandava amandava

bengalí rojo ■

Especie exótica establecida. **Categoría:** C / E2 . Originaria de India, sudeste asiático. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 10; Años: 03, 04, 06, 07; Máx ind: +2000

ANDALUCIA

- 1 ej., 2002, **Sevilla**, capturado para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- 1 ej., 2008, **Sevilla**, capturado para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR), com. por José María Romero).

EXTREMADURA

- 1 ej., hembra, con placa incubatriz, 10.10.2003, Brovales (**Badajoz**), capturada para anillamiento (Hugo Gómez-Tejedor Alonso).
- 6 ej., 1 adulto en muda activa y 5 jóvenes, 16.12.2003, río Ardila a su paso por Valungo (**Badajoz**), capturados para anillamiento (Hugo Gómez-Tejedor Alonso).
- 1 ej., 03.01.2004, Barquilla de Pinares, Talayuela (**Cáceres**) (Dave Langlois).

- Más de 100 ej., 24.01.2004, Galisteo (**Cáceres**), en un dormitorio en zona de arrozal (Javier Prieta).
- Más de 100 ej., en plumaje no nupcial, 07.05.2004, Oliva de Plasencia (**Cáceres**), en labrado de regadío. Sigue la expansión hacia el noreste en la cuenca del Alagón (Javier Prieta).
- 105 ej., mudando de plumaje, sólo 1 macho con plumaje nupcial, 18.01.2005, Galisteo (**Cáceres**) (L.M. Arce). Más de 50 ej. en el dormitorio del arrozal el 15.12 (Javier Prieta).
- Varios ej., algunos con plumaje nupcial, 04.09.2005, Madrigal, Villanueva y Valverde de la Vera (**Cáceres**) (Dave Langlois).
- 1 ej., macho, 22.08.2008, Laguna del Pedazo, Navalmoral de la Mata (**Cáceres**), siendo la primera cita (Pedro Gómez).

- 1 ej., macho, 26.10.2008, Barquilla de Pinares, Talayuela (**Cáceres**) (Dave Langlois y Samuel Langlois).
- 1 ej., 22.11.2008, Casas del Hito, Madrigalejo (**Cáceres**) (Alicia Ortega y Raúl Urquiaga).

- En 2008, se estima que en Extremadura pueda haber una población de más de 5.000 parejas, mostrando una clara tendencia de crecimiento (Javier Prieta y Sergio Mayordomo).

Estrilda melpoda

pico de coral mej. anaranjadas

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 05, 07; Máx ind: 40.

ANDALUCÍA

- 2 ej., 2003, **Sevilla**, capturados para anillamiento. Previamente, 3 ej. en 1996, 6 ej. en 1997, 2 ej. en 1998, 2 ej. en 1999, 5 ej. en 2000, 5 ej. en 2001 y 1 ej. en 2002. Posteriormente, 1 ej. en 2004 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).

- 3 ej., 2008, **Sevilla**, capturados para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- 1 ej., 26.11.2008, Espartinas (**Sevilla**), capturado para anillamiento en una zona de naranjal y olivar. Edad euring 3 (José Luis Arroyo).

Estrilda troglodytes

pico de coral colinegro

Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. **Categoría: E1 / E2**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 04-07; Máx ind: 4.

ANDALUCÍA

- 1 ej., 2002, **Sevilla**, capturado para anillamiento. Previamente, 4 ej. en 1997, 1 ej. en 1998 y 1 ej. en 2001 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- 1 ej., 2008, **Sevilla**, capturado para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).

- 47 ej., 07.12.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**), en el itinerario de Gavà (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: DBMC).
- 30 ej., 2008, ciudad de **Barcelona**, donde la especie es observada durante todo el año en el Parque del Putxet (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: JCPB).

EXTREMADURA

- Varios ej., 20.04.2005, Quintana de la Serena (**Badajoz**), en un grupo de *Estrilda astrild*, siendo la primera cita para Extremadura (Audouin BT).
- 2 ej., juveniles, 29.09.2008, Casas de Hito (**Cáceres**), siendo la primera cita de cría en Extremadura (Travelling Naturalist).

CATALUÑA

- 4 ej., 29.05.2008, Embalse del Foix (**Barcelona**). También 2 ej. el 28.03 (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: PTEA, JDCA, XPCA).

Estrilda astrild

pico de coral común

Especie exótica establecida. **Categoría: C / C**. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).

Ant. Noticiarios: Citas: +; Años: 94, 02-07; Máx ind: +100.

ANDALUCÍA

- 6 ej., 2007, **Sevilla**, capturados para anillamiento. Previamente, 4 ej. en 1996, 6 ej. en 1997, 4 ej. en 1998, 4 ej. en 1999, 8

- ej. en 2000, 14 ej. en 2001, 10 ej. en 2002, 14 ej. en 2003, 4 ej. en 2004, 3 ej. en 2005 y 2 ej. en 2006 (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).

- 45 ej., 2008, **Sevilla**, capturados para anillamiento (Grupo Ornitológico del Sur - GOSUR, com. por José María Romero).
- Diversas observaciones en 2008, y años anteriores, en la provincia de **Córdoba**, donde la especie parece ocupar todo el curso del río Guadalquivir. Se observa entre Palma del Río y Villa del Río, aunque también fue vista en Andújar (Fernando). En Córdoba, presente desde 2005, se observaron 12 ej. en 10.2007 (Antonio Pestaña), uno de ellos construyendo nido, foto. Además, durante 2006 y 2007 se anillaron ejemplares en los Sotos de la Albolafia, frente al Hesperia, se observó un grupo de 7-8 ej. en Casillas, y se anillaron también ejemplares en la zona de la Veguilla, fuera ya del casco urbano (Antonio Pestaña). El 24.05.2008 se observaron 2 ej. junto al río Guadalquivir en Encinarejo (Antonio Ceballos).
- La especie crió en 2008 en Isla Cristina (**Huelva**) (Juan Sagardia).
- Varios ej., 20.09.2008, brazo del este, Doñana (**Sevilla**) (Paco Chiclana).

BALEARS

- Cerca de 40 ej., 02.2008, Parc Natural de s'Albufera (**Mallorca**). En febrero se realizó un control sobre la población existente en el Parque, siendo capturados y retirados 28 ej. (18 machos, 6 hembras y 4 no determinados). Tras la campaña, se observó aún la presencia de un grupo de 10 ej. en libertad (J.C. Fernández-Ordóñez). En 2009, una nueva campaña capturó otros 12 ej., dejando aún 3 en libertad.

CATALUÑA

- Unos 15 ej., 12.01.2008, río Congost, Montornès del Vallès (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CFMA, AERA).
- 58 ej., 12.01.2008, Mataró (**Barcelona**), entre Sant Andreu de Llavaneres y Mataró (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: ACSA).
- 2 ej., 19.01.2008, Bigues i Riells (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: VPRA).
- Varios ej., 26.01.2008, presa del río Francolí (**Tarragona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: ACTA).
- 40 ej., 24.02.2008, Premià de Mar (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: JSPC).
- 38 ej., 16.03.2008, Areny de Vilapou, Olesa de Montserrat (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: JCRD).
- Unos 40 ej., 15.08.2008, Delta del Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: RBVA). También fueron

observados 15 ej. el 10.01 (Pedro Bescós), 10-20 ej. en 09.2008 y 10.2008 (Antonio Rodríguez Sinovas), y 20 ej. el 26.11 (Pedro Bescós).

- 10 ej., 22.08.2008, Molins de Rei (**Barcelona**), en los aiguamolls (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CFMA i RDSA).
- 10 ej., 23.08.2008, Cabrera de Mar (**Barcelona**), alimentándose junto con *Passer domesticus* (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: JPSA).
- 12 ej., 24.08.2008, Dosrius (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CFMA, RDSA).
- 8 ej., 12.09.2008, Castellet i la Gornal (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: CGGA, XBGA, HSCA).
- Varios ej., juveniles, 08.11.2008, Fogars de la Selva (**Barcelona**), capturados para anillamiento, revelando la existencia de cría (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: HAPA, JGMA).
- 125 ej., 05.12.2008, Sils (**Girona**), donde la especie está presente de forma regular en las lagunas. También capturada una hembra con placa incubatriz el 07.07 (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: XRCA, TMXC, JVLA).
- Más de 50 ej., 17-22.12.2008, Sant Boi de Llobregat (**Barcelona**) (Anuari Ornitol. Cat. 2008 - ICO: JGMF).

EXTREMADURA

- 2 ej., 18.04.2004, peña de Alange (**Badajoz**), junto a collalbas negras (John Muddeman).
- 6 ej., 20.04.2004, Herguijuela (**Cáceres**) (John Muddeman).
- 2 ej., 07.07.2004, Embalse de Valdesalor (**Cáceres**) (Carlos Fernández).
- 2 ej., 12.09.2004, Pago de San Clemente (**Cáceres**) (Martin Kelsey).
- 1 ej., hembra, 15.05.2005, río Guadalupejo, Alía (**Cáceres**) (J.A. Herrera, J. Cerezo y N. Baeza).
- 10 ej., 09.10.2005, río Salor (**Cáceres**) (Carlos Fernández).
- Más de 25 ej., 28.03.2006, Embalse de Valdesalor (**Cáceres**) (Carlos Fernández).
- Varios ej., 23.04.2006, Arrocampo (**Cáceres**) (Audouin BT). Posteriormente, 3 ej. el 10.12 (Sergio Mayordomo).
- 7 ej., 12.09.2006, Embalse de Portaje (**Cáceres**) (Carlos Fernández).
- 7 ej., 28.07.2007, Riobobos (**Cáceres**), en un arrozal (Sergio Mayordomo).
- 4 ej., 30.07.2007, Arrocampo (**Cáceres**) (Sergio Mayordomo).
- Varios ej., 16.09.2007, Embalse de los Canchales (**Badajoz**) (Carlos Fernández, Florencio Carrero y Juan Manuel Brías).

- 1 ej., 09.11.2007, Calzadilla (**Cáceres**), en un olivar (Ángel Rodríguez Martín).
- 10-15 ej., 15.02.2008, Valencia de Alcántara (**Cáceres**) (Alfonso Pulgar), comiendo en el suelo en la ribera de Abid.
- 8 ej., 20.12.2008, Valdeobispo (**Cáceres**), en un eneal de una charca (César Clemente y Javier Mahillo).

- En 2008, se estima que en Extremadura pueda haber una población de más de 3.000 parejas, mostrando una clara tendencia de crecimiento (Javier Prieta y Sergio Mayordomo).

Taeniopygia guttata

diamante mandarín ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría: E3 / E3.** Originaria de Australia.
Ant. Noticiarios: Citas: 5; Años: 03, 05-07; Máx ind: 10.

EXTREMADURA

- 1 ej., macho adulto, 26.07.2008, Acebo (**Cáceres**), en el área recreativa de las piscinas natural "El Jevero", sobre el cauce de la garganta la Cervigona. Se pasa todo el día buscando restos de comida de las personas que acuden al área recreativa (Jesús Solana Ramos, Domingo Jorge Cordobilla).

MURCIA

- 1 ej., 19.03.2008, Los Narejos, San Javier (**Murcia**), en una zona urbanizada (A. Sallent, A.M. García López, C. Rolland, A. Selbach).



Taeniopygia guttata. San Javier, Murcia, marzo 2008.
Foto: Christoph Rolland.

VIDUIDAE

Vidua macroura

viuda colicinta

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / E3. Originaria de África.
Ant. Noticiarios: Citas: 1; Años: 07; Máx ind: 1.

CATALUÑA

• 2 ej., machos, 08.2008, río Congost, Granollers (**Barcelona**). El 29.08 se observó un macho, quizás uno de los

anteriores, más arriba en el río Congost, en La Garriga (com. por Ferran J. Lloret).
Fotos.



Vidua macroura. Río Congost, Granollers, Barcelona, agosto 2008. Foto: Robert Manzano.

ICTERIDAE

Cacicus cela **nueva**

cacique lomiamarillo

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Sudamérica.
Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCIA

• 2 ej., principios de 04.2008, **Málaga**. Posteriormente, visto uno de ellos el 13.04 (Angel García), foto.



Cacicus cela. Málaga, abril 2008. Foto: Ángel García

X. xanthocephalus **nueva**

turpial de cabeza amarilla ■

Especie exótica, observada de forma ocasional. **Categoría:** E3 / – . Originaria de Norteamérica.

Ant. Noticiarios: Citas: – ; Años: – ; Máx ind: – .

ANDALUCIA

• 1 ej., 08.12.2008, Guadalhorce (**Málaga**) (Francisco Rivera y otros, com. por Andy Paterson), fotos. Seguramente el mismo

ejemplar fue visto el día siguiente, en el mismo lugar, e identificado como *Agelaius icterocephalus* (José Luis Postigo, José Manuel Romero).



Xanthocephalus xanthocephalus.
Málaga, diciembre 2008.
Foto: Paco Ribera